

USAGE DES DROGUES

Enquête de Santé 2018

—

LYDIA GISLE

Sciensano

Epidémiologie et santé publique - Mode de vie et maladies chroniques

HIS 2018

Octobre 2019 • Bruxelles • Belgique

USAGE DES DROGUES

Auteur principal : Lydia Gisle

•

Réviseur : Sabine Drieskens

•

Éditeurs : Lydia Gisle, Sabine Drieskens

Personne de contact : Lydia Gisle • T+32 2 642 57 53 • Lydia.Gisle@sciensano.be

Merci de citer cette publication comme suit :

L. Gisle, S. Drieskens . Enquête de santé 2018 : Usage des drogues Bruxelles, Belgique : Sciensano ; Numéro de rapport : D/2019/14.44/68. Disponible en ligne : www.enquetesante.be

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier les personnes suivantes :

Jérôme Antoine de Sciensano pour la relecture attentive de ce rapport

Ledia Jani et Tadek Krzywania de Sciensano pour la mise en page et le support administratif

Sandrine de Waleffe et l'équipe de Statbel pour l'organisation du travail de terrain

L'équipe des enquêteurs pour la collecte des données

Et toutes les personnes qui ont volontairement participé à l'enquête

COMMANDITAIRES

Cette enquête est réalisée à l'initiative du :

Gouvernement fédéral, Ministère des Affaires sociales et de la Santé publique

Gouvernement flamand, Ministère du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale (COCOM), Politique de la Santé

Communauté française, Ministère de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Égalité des chances

Gouvernement wallon, Ministère de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances

Communauté germanophone, Ministère de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ	6
ABRÉVIATIONS	7
INTRODUCTION	8
QUESTIONS	9
INDICATEURS	11
RÉSULTATS	12
1. Usage expérimental du cannabis	12
1.1. Prévalence en Belgique	12
1.2. Evolution	12
1.3. Différences démographiques	13
1.4. Différences socio-économiques	14
1.5. Analyses complémentaires	14
2. Usage récent du cannabis (12 derniers mois)	15
2.1. Prévalence en Belgique	15
2.2. Evolution	15
2.3. Différences démographiques	16
2.4. Différences socio-économiques	17
3. Usage actuel (dernier mois) et intensif du cannabis	17
3.1. Prévalence en Belgique	17
3.2. Evolution	17
3.3. Différences démographiques	18
3.4. Différences socio-économiques	19
4. Usage problématique du cannabis	19
4.1. Prévalence en Belgique	19
4.2. Evolution	19
4.3. Différences démographiques	19
4.4. Différences socio-économiques	20
4.5. Analyses complémentaires	21
5. Autres substances psychoactives	22
5.1. Prévalence en Belgique	22
5.2. Evolution	22
5.3. Différences démographiques	23
5.4. Différences socio-économiques	24
6. Substances utilisées dans l'année	24
6.1. Prévalence en Belgique	24
6.2. Spécificités régionales	25
6.3. Evolution	25
7. Polyconsommation dans l'année	26
7.1. Prévalence en Belgique	26
7.2. Evolution	26
7.3. Différences démographiques	27
7.4. Différences socio-économiques	27
8. Tableaux de synthèse	28
SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS	30
RÉFÉRENCES	33
LISTE DES TABLEAUX	34

RÉSUMÉ

Le monitoring de l'usage des drogues (cannabis, cocaïne, amphétamines, opiacés, ...) et son évolution dans le temps au sein de la population belge est une responsabilité de santé publique, et ce, en raison des graves conséquences sanitaires et sociales que leur consommation peut engendrer et de la charge sociétale que cela représente. Ce rapport fait état des dernières estimations en matière de consommation de substances psychoactives à partir de l'enquête nationale de santé de 2018 et tente de dégager le profil associé afin d'orienter les mesures préventives vers les populations les plus à risque. Les principaux résultats, limités à la **population âgée de 15 à 64 ans**, se déclinent comme suit :

- La consommation de cannabis et d'autres substances psychoactives a augmenté de manière significative en Belgique entre 2013 et 2018.
- 22,6% de la population âgée de 15 à 64 ans déclare avoir déjà essayé le cannabis à un moment de son existence (15% en 2013).
- 7,0% a fait usage du cannabis au cours des 12 mois précédant l'enquête (4,6% en 2013).
- 4,3% a consommé du cannabis dans les 30 jours avant l'enquête (2,6% en 2013).
- ✓ Parmi ces usagers actuels, un sur trois rapporte une consommation (presque) quotidienne du cannabis, soit d'au moins 20 jours sur les 30 derniers jours (c'est deux fois plus qu'en 2013).
- En 2018, trois personnes sur cent (15-64 ans) présente une consommation problématique de cannabis, considérant certains signes comme par exemple, consommer en matinée, consommer seul(e), avoir eu des problèmes liés à la consommation de cette substance, ne pas pouvoir diminuer/arrêter et ce malgré des remarques de l'entourage.
- 9,0% des citoyens (15-64 ans) déclarent avoir pris un autre stupéfiant que le cannabis (3,6% en 2013), et un tiers de ceux-ci (soit 2,9% de la population) l'ont fait dans les 12 mois avant l'enquête (0,8% en 2013).
- La cocaïne (1,5%) et l'ecstasy (1,2%) sont les drogues les plus consommées après le cannabis. Le nombre de consommateurs est également en hausse par rapport à 2013 (respectivement 0,5% et 0,3%).
- La consommation de stupéfiants concerne plus largement les jeunes de 15 à 24 ans et les hommes (de 15 à 34 ans), issus de tous les milieux sociaux. Pour illustrer ceci :
 - ✓ À Bruxelles, un jeune homme sur cinq (20,5%) de 15 à 24 ans a consommé du cannabis dans les 12 mois, soit trois fois le chiffre observé pour de l'ensemble de la population (7% des 15-64 ans) ;
 - ✓ En Flandre, l'usage récent de cocaïne parmi les hommes de 25-34 ans atteint une proportion de 8,3% soit trois fois le pourcentage pour l'ensemble des citoyens flamands (1,7% des 15-64 ans).
- C'est en Région bruxelloise que l'usage des drogues de toute nature est le plus répandu.

Ces résultats appellent les autorités à renforcer les mesures d'information et de prévention auprès des adolescents et des jeunes adultes, mais également à redoubler les efforts en matière d'accompagnement et d'offre de traitement vis-à-vis des personnes (et leur famille) aux prises avec ces substances, et ce, dans une perspective de réduction des risques et dommages au sens large, sans stigmatisation. Par ailleurs, loin de jeter l'opprobre sur les usagers, une augmentation du recours aux stupéfiants au sein de la population doit nourrir une réflexion plus vaste et holistique sur le type de société léguée aux jeunes générations, et plus spécifiquement sur les normes et les valeurs qu'elle véhicule, sur la multiplicité des exigences qu'elle leur impose, et sur la place qu'elle leur réserve en termes d'intégration sociale et économique.

ABRÉVIATIONS



BHIS	Belgian Health Interview Survey (Enquête de santé belge)
CAST	Cannabis Abuse Screening Test
CIM-10	Classification Internationale des Maladies, version 10
DSM	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
EHIS	European Health Interview Survey / Enquête de santé européenne
ESPAD	European School Survey Project on Alcohol and other Drugs
GDS	Global Drugs Survey
HBSC	Health Behaviors in School-aged Children
NDS	Nouvelles drogues de synthèse
NSP	Nouvelles substances psychoactives
N.S.	Non significatif
OEDT	Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies
OFDT	Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies
RB	Région bruxelloise
RF	Région flamande
RW	Région wallonne
TDI	Treatment Demand Indicator

INTRODUCTION



En Belgique, les informations relatives à la consommation de substances psychoactives au sein de la population générale sont en grande partie tirées de l'enquête nationale de santé. D'autres enquêtes existent au niveau des régions, ou dans le cadre scolaire/étudiantin (p.ex., ESPAD 2015; HBSC 2014), dans les milieux directement concernés par la drogue, ou via des sites internet (GDS 2016), mais elles ne permettent pas d'établir des statistiques populationnelles à l'échelon national.

Les statistiques produites au moyen de l'enquête de santé sous-estiment toutefois l'usage réel des drogues dans le pays, en ce sens qu'elle passe à côté des populations marginalisées (incarcérées, institutionnalisées, sans domicile fixe, etc.) parmi lesquelles on compte un nombre important d'usagers de drogues. Par ailleurs, l'usage des substances étudiées étant « illicite », certains participants à l'enquête pourraient être réticents à rapporter leur consommation, malgré la garantie de l'anonymat des réponses. Cela étant, avec une méthodologie d'enquête reproduite à l'identique dans le temps, les données collectées sont comparables et permettent malgré tout de dégager des tendances évolutives fiables sur la question. Le module sur l'usage des "drogues illicites" vise donc à évaluer dans la population générale la proportion d'individus qui consomment du cannabis - la substance la plus consommée en Belgique et dans le monde – ainsi que d'autres produits illicites dont la consommation est plus rare comme la cocaïne, les amphétamines, l'ecstasy, les opiacés, l'héroïne, les produits hallucinogènes, ou les « nouvelles substances psychoactives » (NSP) aussi connues sous l'appellation de « nouvelles drogues de synthèse » (NDS).

Le dernier rapport de l'Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT, 2019) (1) basé sur les données d'enquêtes en population générale indique que plus d'un quart des citoyens (de 15 à 64 ans) de l'Union européenne, soit 96 millions d'individus, a déjà consommé des drogues illicites au cours de leur vie ; environ 91,5 millions de personnes auraient expérimenté le cannabis, 18,1 millions la cocaïne et 13,9 millions l'ecstasy/MDMA. Les jeunes adultes (15-34 ans) constituent la majorité des consommateurs récents (dans l'année), toutes drogues confondues. Ils seraient 16,0% à avoir consommé des drogues et 14,4% du cannabis au cours de l'année écoulée. La plupart des pays font état d'une consommation récente de cannabis stable ou en hausse chez les jeunes adultes depuis 2016. Depuis l'année 2000, une tendance à la hausse de la prévalence de la consommation de cannabis chez les jeunes adultes durant l'année écoulée a été observée dans un certain nombre de pays.

Au vu des dangers à court et à long terme que peut présenter la consommation des drogues pour la santé physique, mentale et sociale des usagers, ainsi que les problèmes qu'elle peut engendrer pour leur entourage et la société, la problématique d'usage des drogues et les assuétudes sont inscrites parmi les priorités d'une politique globale de promotion de la santé. Une des missions liminaires des pouvoirs publics en Belgique est de miser sur la prévention de l'expérience des drogues chez les jeunes, mais aussi, la prévention du passage à la consommation chronique et intensive, ainsi que sur la réduction des risques et des dommages liés à leur consommation.

Il est dès lors utile, en amont, d'avoir une image représentative de l'évolution de l'usage des différentes substances psychoactives en Belgique et d'identifier les groupes les plus à risque pour une consommation problématique. L'enquête de santé tente de répondre à un certain nombre de ces aspects, et se positionne par là comme un outil d'appui pour le développement d'une politique éclairée. L'enquête de santé n'a toutefois pas la vocation de pouvoir étudier les conséquences psychosociales et sanitaires de l'usage des drogues illicites. Aussi, d'autres types de recherches ciblés sur les produits utilisés, le contexte d'usage et la population des usagers doivent être promus pour forger une meilleure compréhension de la problématique et trouver les meilleurs moyens de venir en aide aux plus vulnérables.

QUESTIONS



Le module relatif à l'usage des drogues comporte deux parties : la première concerne l'usage du cannabis, la drogue la plus utilisée parmi toutes, tandis que la seconde explore l'usage d'autres substances psychoactives illicites. Les questions sur la consommation de cannabis proviennent du questionnaire standardisé élaboré par l'Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT) (3) et sont désormais reprises dans chaque enquête de santé successive pour des fins de comparaison dans le temps.

Les questions sur la consommation de drogues sont placées dans l'auto-questionnaire, un livret que le répondant complète par lui-même et remet à l'enquêteur sous enveloppe scellée. Cette procédure vise à éviter que la personne interrogée ne soit influencée dans ses réponses (gêne, crainte) par la présence de l'enquêteur. L'auto-questionnaire s'adresse aux personnes âgées de 15 ans et plus.

Changements par rapport à l'enquête de 2013

La nouveauté dans cette première série de questions est l'inclusion d'une échelle de 6 items (voir ID.04) : le CAST (*Cannabis Abuse Screening Test*) (4). Cet outil a été développé à l'OFDT pour fournir une estimation des usages problématiques du cannabis dans les enquêtes épidémiologiques en population générale, basée sur les critères issus des diagnostics du DSM-IV et de la CIM-10. Dans la seconde partie du questionnaire, le changement introduit en 2018 concerne, pour chaque produit de la liste (voir ID.07), à quel moment – le cas échéant – la personne l'aurait pris pour la dernière fois.

Consommation de cannabis

- ID.01.** Vous est-il arrivé de consommer du cannabis (haschisch ou marijuana, aussi connu comme herbe, shit, joint, kif, beuh...) ? *(Oui / Non)*
- ID.02.** A quel âge avez-vous pris du cannabis pour la première fois ?
- ID.03.** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé du cannabis ? *(Oui / Non)*
- ID.04.** Au cours des 12 derniers mois, ...
(Jamais / Rarement / De temps en temps / Souvent / Très souvent)
- 01.** Avez-vous consommé du cannabis avant midi ?
- 02.** Avez-vous consommé du cannabis lorsque vous étiez seul(e) ?
- 03.** Avez-vous eu des problèmes de mémoire quand vous consommiez du cannabis ?
- 04.** Avez-vous eu d'autres problèmes à cause de votre consommation de cannabis (dispute, bagarre, accident, mauvais résultats à l'école ou mauvais rendement au travail...) ?
- 05.** Des amis ou des membres de votre famille vous ont-ils dit que vous deviez réduire votre consommation de cannabis ?
- 06.** Avez-vous essayé de réduire ou d'arrêter votre consommation de cannabis sans y parvenir ?
- ID.05.** Au cours des 30 derniers jours, avez-vous consommé du cannabis ? *(Oui / Non)*
- ID.06.** Lors de ces 30 derniers jours, quel est le nombre de jours au cours desquels vous avez consommé du cannabis ?
(Tous les jours / 20 à 29 jours / 10 à 19 jours / 4 à 9 jours / 1 à 3 jours)

Consommation d'autres substances

ID.07. Quelles autres substances avez-vous consommées, ne serait-ce qu'une seule fois, et quand les avez-vous prises en dernier ?

(Dans les 30 derniers jours / Dans les 12 derniers mois / Il y a plus de 12 mois / Jamais)

01. Cocaïne
02. Crack
03. Ecstasy (XTC, MDMA)
04. Amphétamines, speed
05. Méthamphétamines
06. Kétamine
07. GHB/GBL
08. Héroïne
09. LSD ou autres hallucinogènes (champignons magiques, psilos, DMT, mescaline, ayahuasca...)
10. Opioïdes non prescrits pour vous par un médecin (ex.: fentanyl, buprenorphine, oxycodone, codéine,...)
11. Nouvelles substances psychoactives (NSP), connues comme des "euphorisants légaux"/"nouveaux produits de synthèse"/ "research chemicals": par ex. les cannabinoïdes de synthèse, méphédronne, spice, 4-FA, K2, 25I-NBOMe ...
12. Médicaments psychoactifs **non** prescrits pour vous par un médecin (ex. Valium, Relatine, Rohypnol, Temesta...)

INDICATEURS

Les indicateurs relatifs à l'usage du cannabis et autres substances psychoactives sont présentés pour les groupes d'âge entre 15 et 64 ans.

- ID01_1** Basé sur la question ID.01. Proportion (%) de personnes qui ont pris du cannabis au moins une fois au cours de leur existence, au sein de la population âgée de 15 à 64 ans. L'indicateur fait référence à ce que l'on appelle la « prévalence d'une vie » de l'usage du cannabis ou « usage expérimental du cannabis ».
- ID02_1** Basé sur les questions ID.01 et ID.02. Parmi les consommateurs de cannabis (d'une vie) âgés de 15 à 64 ans, âge (moyen) au moment de leur première prise de cannabis.
- ID03_1** Basé sur les questions ID.01 et ID.03. Proportion (%) des personnes qui ont pris du cannabis au cours des 12 mois qui ont précédé l'administration du questionnaire, au sein de la population âgée de 15 à 64 ans. Il s'agit de la « prévalence d'un an » de l'usage du cannabis ou « usage récent de cannabis ».
- ID03_2** Basé sur les questions ID.01 et ID.03. Parmi les consommateurs (d'une vie) âgés de 15 à 64 ans, proportion (%) qui n'ont pas consommé de cannabis au cours des 12 derniers mois. Cet indicateur rend compte de l'abandon (récent) du cannabis.
- ID04_2** Basé sur les items de la question ID.04. Somme des scores individuels (recodés 0-4) des 6 items (= total de 0 à 24) et définition de la consommation problématique à la valeur-seuil de 7 et plus. Proportion de personnes qui présentent une consommation problématique de cannabis ces 12 derniers mois au sein de la population âgée de 15 à 64 ans.
- ID05_1** Basé sur les questions ID.01, ID03 et ID05. Proportion (%) ayant consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours au sein de la population de 15 à 64 ans. Il indique la prévalence d'un mois de l'usage du cannabis ou « usage actuel de cannabis ».
- ID06_1** Basé sur les questions ID.05 et ID06. Parmi les consommateurs actuels de cannabis (dans le mois) âgés de 15 à 64 ans, distribution (%) selon la fréquence d'utilisation (4 catégories). Cet indicateur mesure l'intensité de la consommation actuelle de cannabis.
- ID06_2** Basé sur les questions ID.05 et ID06. Proportion (%) des personnes ayant un usage intensif du cannabis (20 jours ou plus sur les 30 derniers) au sein de la population âgée de 15 à 64 ans.
- ID07_1** Basé sur la question ID.07. Parmi la population âgée de 15 à 64 ans, proportion (%) ayant déjà consommé une drogue autre que le cannabis au cours de leur vie. L'indicateur décrit la prévalence d'une vie ou de l'usage expérimental d'autres drogues que le cannabis.
- ID07_2** Basé sur la question ID.07. Proportion (%) de la population âgée de 15 à 64 ans ayant pris une drogue autre que le cannabis au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête.
- ID07_3** Basé sur la question ID.07. Proportion (%) de la population âgée de 15 à 64 ans ayant pris une drogue autre que le cannabis au cours des 30 jours qui ont précédé l'enquête.
- ID_1** Basé sur les questions ID.03 et ID.07. Proportion (%) de la population âgée de 15 à 64 ans ayant pris plus d'une substance psychoactive différente au cours des 12 derniers mois.

RÉSULTATS



1. Usage expérimental du cannabis

Les résultats présentés ici concernent la prévalence de l'usage expérimental du cannabis, définie comme la proportion de personnes ayant consommé du cannabis au moins une fois au cours de leur vie. Cet indicateur (ID01_1) inclut dès lors à la fois des personnes qui ne consomment plus au moment de l'enquête ainsi que d'autres qui en consomment (encore) actuellement. Afin de faire la distinction, on rapporte également la proportion de consommateurs d'une vie qui n'ont pas pris de cannabis dans les 12 mois écoulés (ID03_2). Enfin, l'âge au moment de l'initiation au cannabis est également rapporté dans cette section (ID02_1).

1.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE


En 2018, 22,6% de la population âgée de 15 à 64 ans a déjà consommé du cannabis au moins une fois au cours de sa vie. Parmi ces utilisateurs d'une vie, 69,0% n'a pas consommé dans les 12 derniers mois. En d'autres termes, plus de deux tiers sont d'anciens consommateurs et un petit tiers sont des consommateurs récents (voir point 2.1). L'âge au moment de l'initiation au cannabis est de 19,2 ans en moyenne.

Spécificités régionales

Comme lors des enquêtes précédentes, la proportion de personnes (de 15-64 ans) ayant déjà essayé le cannabis est plus élevée à Bruxelles (30,2%) que dans les deux autres régions du pays (22,0% chacune). La différence entre Bruxelles et chaque région est significative. De plus, les consommateurs qui n'ont pas pris de cannabis dans les 12 derniers mois sont aussi plus nombreux dans les Régions flamande et wallonne (respectivement 71,3% et 69,0%) par rapport à la Région bruxelloise (58,8%). L'âge à l'initiation du cannabis est le même dans les trois régions du pays (entre 19,0 et 19,3 ans).

1.2. EVOLUTION

Figure 1 | Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant déjà consommé du cannabis au cours de sa vie, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018



Le nombre relatif de personnes ayant déjà essayé le cannabis augmente au fil du temps. Cette évolution est « normale » pour autant qu'elle soit progressive. C'est le cas entre 2001 et 2013 (10,7% à 15,0%) (Figure 1). En revanche, le nombre de personnes ayant expérimenté le cannabis a fortement progressé si l'on s'en remet aux valeurs de 2018, puisqu'elles représentent 22,6% de la population âgée de 15 à 64 ans. L'âge à l'initiation au cannabis (19,2 ans) a augmenté par rapport à 2013 (18,4 ans, n.s.) pour retrouver les valeurs obtenues entre 2004 et 2008.


Spécificités régionales

Cette progression rapide du pourcentage d'expérimentateurs au cours des 5 années écoulées depuis la précédente enquête s'est produite en parallèle dans les trois régions du pays, faisant un bond de 7 à 8 points de pourcentage entre 2013 et 2018. Dans les Régions flamande et wallonne, la prévalence d'une vie passe d'environ 14% en 2013 à environ 22% en 2018 ; à Bruxelles, elle était déjà de 22% en 2013 et passe à 30% en 2018. Pourtant, la proportion des abandons au cours de l'année écoulée ne suit pas la même progression (différences entre les années non significatives).

1.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES

La prévalence de l'expérience du cannabis est significativement moins élevée parmi les femmes (17,3%) que parmi les hommes (28,1%), et en outre, les femmes (78,5%) sont plus nombreuses que les hommes (63,0%) à avoir abandonné le cannabis depuis au moins une année.

Figure 2 | Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui déclare avoir consommé du cannabis au moins une fois au cours de sa vie, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018



C'est dans le groupe d'âge de 25 à 34 ans, que l'on trouve la plus grande proportion d'individus ayant déjà fait l'expérience du cannabis (38,1% et presque un homme sur deux de cet âge !), suivi du groupe des 35-44 ans (29,6%). Un quart des jeunes de 15-24 ans (25,7%) a déjà essayé le cannabis ; or son abandon, quant à lui, est relativement faible chez ces jeunes (39,8%) ; il augmente toutefois en fonction de l'âge (à 55-64 ans, 91,4% des expérimentateurs n'ont plus consommé de cannabis récemment).

Spécificités régionales

La surreprésentation masculine auprès des expérimentateurs de cannabis est observée dans les trois régions du pays. Ce qui fait la différence entre les trois régions, c'est la distribution par âge. En RF, elle est similaire à celle décrite au niveau national (Figure 2). La distribution par âge en Wallonie diffère en ce que les jeunes wallons (15-24 ans) sont proportionnellement plus nombreux que les jeunes flamands (15-24 ans) à avoir essayé le cannabis (30,3% versus 20,8%). En outre, l'expérimentation du cannabis touche plus de jeunes femmes (15-24 ans) en RW (27,7%) qu'en RF (14,6%). Elles sont également plus nombreuses (26,2%) en RB qu'en RF, mais ce sont incontestablement les jeunes hommes (15-24 ans) de Bruxelles qui détiennent le record absolu (48,3% contre 32,8% en RW et 26,7% en RF) pour l'expérience du cannabis.

1.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES

Plus le niveau d'éducation est élevé, plus la proportion d'individus ayant expérimenté le cannabis est grande. En 2018, elle est de 14,5% parmi les moins éduqués (sans diplôme ou école primaire) et atteint 26,1% des individus les plus instruits (éducation supérieure). La différence de prévalence entre les deux niveaux extrêmes de l'échelle sociale est significative. Dans le même temps, plus le niveau d'éducation est élevé, plus grande est la tendance à abandonner le cannabis : 49,5% chez les diplômés/école primaire à 72,5% des diplômés du supérieur. Enfin, on note aussi un gradient social au niveau de l'âge auquel le cannabis a initialement été consommé, qui passe de 17,7 ans chez les non-diplômés à 19,5 ans chez les diplômés de l'enseignement supérieur.

Spécificités régionales

Dans les trois régions, c'est parmi les plus instruits que l'on trouve le plus grand nombre de personnes ayant expérimenté le cannabis. En Région flamande, ceux qui abandonnent le cannabis varie peu en fonction du niveau d'éducation, de 67,7% chez les non-diplômés à 72,8% chez les plus instruits. La différence entre classes sociales est marquée en Région wallonne entre les diplômés du supérieur (77,2%) et les classes moins instruites (52 à 58%). Et à Bruxelles, les abandons sont peu fréquents parmi les non-diplômés (13,1%) par rapport aux autres niveaux sociaux. Ces résultats par niveau d'éducation ne sont pas cependant pas statistiquement significatifs au plan régional.

1.5. ANALYSES COMPLÉMENTAIRES

Vu les résultats atypiques pour Bruxelles, nous avons cherché à savoir si le niveau d'éducation ou l'origine culturelle des ménages pouvaient expliquer les différences observées par rapport aux deux autres régions. Or les analyses ajustées pour l'éducation et pour le pays d'origine (outre la standardisation par âge et par sexe) montrent que les différences entre Bruxelles et les deux autres régions se creusent davantage. Ce résultat découle sans doute du fait que les personnes issues d'un ménage non-européen (plus nombreux dans la capitale) sont moins enclins à expérimenter le cannabis que celles provenant des ménages d'origine belge.

Par contre, les différences régionales ne sont plus statistiquement significatives lorsque la Région bruxelloise est comparée uniquement aux zones hautement urbanisées des deux autres régions du pays. On peut dès lors en déduire que Bruxelles a ce statut particulier de par sa nature foncièrement urbaine.

2. Usage récent du cannabis (12 derniers mois)

L'indicateur de la prévalence-année des consommateurs de cannabis est celui qui rend le mieux compte des comportements habituels puisqu'il capte les consommateurs irréguliers, sans pour autant inclure ceux qui ont essayé le cannabis sans nécessairement poursuivre sa consommation.

2.1. PREVALENCE EN BELGIQUE

En 2018, 7,0% de la population belge âgée de 15 à 64 ans déclare avoir consommé du cannabis au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête.


Spécificités régionales

La consommation récente de cannabis est bien plus fréquente en Région bruxelloise (12,4%) - région urbaine par essence - qu'en Flandre (6,2%) et en Wallonie (6,8%), et les différences sont significatives.

2.2. EVOLUTION

Si l'on pouvait se targuer d'une stabilité, voire une légère diminution des consommateurs récents de cannabis entre 2004 et 2013 (autour de 5%), force est de constater que leur nombre a augmenté en 2018 (7,0%), et ce de manière statistiquement significative.

Figure 3 | Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018




Spécificités régionales

L'évolution des prévalences-année de consommateurs de cannabis depuis ces 15 dernières années présente certaines spécificités régionales (Figure 3). La Région bruxelloise a, depuis l'enquête de 2004, toujours présenté des valeurs d'environ 4 points de pourcentage supérieures aux valeurs observées en Flandre. En dépit de cet écart, ces deux régions ont connu une évolution parallèle, qui se reflète au niveau national : stabilité du nombre relatif de consommateurs - voire légère diminution - entre 2004 et 2013, et hausse significative de la prévalence en 2018. Cette augmentation replace la Flandre au même niveau que la Wallonie en terme de prévalence des consommateurs récents, alors que les deux régions avaient connu une progression opposée entre 2008 et 2013. La Wallonie connaît quant à elle une hausse modérée mais constante du nombre de consommateurs récents de cannabis depuis 2004.

2.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES

Globalement, l'usage récent du cannabis est plus courant parmi les hommes (10,4%) que parmi les femmes (3,7%), et cette différence se reflète à tous les âges jusqu'à environ 45 ans. Les plus jeunes sont les plus nombreux à avoir consommé dans l'année écoulée (15,5% de consommateurs récents parmi les 15-24 ans ; 12,2% parmi les 25-34 ans, n.s.), et ce nombre diminue avec l'âge pour atteindre moins d'1% dans le groupe des 55-64 ans. On notera qu'en moyenne un homme sur cinq entre 15 et 34 ans aura consommé du cannabis dans l'année écoulée.

Figure 4 | Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018



Spécificités régionales

La région atypique en termes de distribution des consommateurs récents par âge et par sexe est Bruxelles. Du côté des hommes, on observe que près d'un jeune sur trois âgé de 15 à 24 ans a consommé du cannabis dans l'année écoulée, ce qui est deux fois plus qu'en Flandre. De plus, si le nombre de consommateurs est équivalent dans les trois régions parmi les hommes de 25-34 ans, à Bruxelles les proportions de consommateurs récents restent plus élevées qu'ailleurs dans les tranches d'âge plus avancé. Notons que les femmes en RB sont deux fois plus nombreuses (6,8%) qu'ailleurs à consommer du cannabis. Il est aussi frappant de s'apercevoir qu'elles sont, entre 25 et 34 ans, presque trois fois plus nombreuses à consommer à Bruxelles que dans les autres régions.

2.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES

Globalement, on ne constate pas de gradient social dans la consommation récente de cannabis en Belgique, au contraire de ce qui était observé pour la consommation d'une vie (cf. point 1.4).

Spécificités régionales

A Bruxelles, par contre, les consommateurs de cannabis sont plus nombreux parmi les personnes issues de l'enseignement supérieur (14,0%) que parmi les diplômés du secondaire (9 à 10%). Dans les deux autres régions, aucune différence n'atteint le degré de signification statistique requis.

3. Usage actuel (dernier mois) et intensif du cannabis

Il s'agit ici d'évaluer la proportion de consommateurs « actuels » (c'est-à-dire dans le mois écoulé : ID05_1) au sein de la population âgée de 15 à 64 ans, et d'estimer dans quelle mesure ils ont recours au cannabis, en termes de fréquence de consommation (ID06_1). Les figures se centrent ici sur les consommateurs intensifs (= 20+ jours au cours des 30 derniers jours) dans la population âgée de 15-64 ans (ID06_2).

3.1. PREVALENCE EN BELGIQUE

En 2018, 4,3% des Belges de 15 à 64 ans ont consommé du cannabis dans le mois qui a précédé l'enquête. Sur cette période de 30 jours, 29,9% des usagers ont consommé au cours de 20 jours ou plus, 15,2% en ont consommé 10 à 19 jours et 54,8% entre 1 à 9 jours sur le mois.


Spécificités régionales

Les consommateurs actuels de cannabis sont plus nombreux au sein de la population Bruxelloise (8,2%) qu'en RF (3,6%) et en RW (4,5%). Cependant, la consommation intensive (20+ jours) est, elle, moins fréquente parmi les consommateurs Bruxellois (24,2%) que parmi ceux de Wallonie (33,7%) ou de Flandre (29,5%).

3.2. EVOLUTION

Tout comme les indicateurs de consommation précédents, l'usage actuel du cannabis s'est quelque peu étendu au sein de la population belge âgée de 15 à 64 ans, passant grosso modo de 3% sur la période 2001-2013 à 4,3% en 2018, une différence qui s'avère statistiquement significative.

Figure 5 | Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant consommé du cannabis au cours des derniers 30 jours (ID05_1) et ceux en ayant consommé à raison de 20 jours ou plus sur les 30 derniers jours (ID06_1), par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018



Quant aux consommateurs intensifs (20+ jours sur les 30 derniers), si les proportions étaient jusqu'ici restées cantonnées sous la barre symbolique des 1% de la population de référence, en 2018 elle atteint 1,3%.


Spécificités régionales

L'augmentation de la proportion de consommateurs actuels en Flandre en 2018 (3,6%) fait suite à une légère diminution observée pour l'année 2013 (1,7%). En Wallonie, la hausse du nombre de consommateurs actuels a été progressive mais continue au cours du temps avec une prévalence qui atteint déjà 3,6% en 2013 et 4,5% en 2018. A Bruxelles, la progression se fait en dents de scie, mais n'a jamais atteint les proportions actuelles (8,2%). L'usage intensif du cannabis (20 jours ou plus sur les 30 derniers) a augmenté dans les mêmes proportions dans les trois régions du pays.

3.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES

Au niveau national, les consommateurs actuels de cannabis se comptent davantage parmi les hommes (6,7% contre 1,9% parmi les femmes) et dans les classes d'âge plus jeunes (autour de 8% des 15-34 ans, 5,5% des 35-44 ans). La Figure 6 montre la distribution par âge et sexe. L'usage intensif du cannabis (20+ jours sur 30 derniers) est aussi plus fréquent parmi les hommes (2,3% contre 0,3% des femmes) et les jeunes adultes (2,6% des 25-34 ans).

Figure 6 | Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018



Spécificités régionales

Les consommateurs actuels de cannabis chez les jeunes de 15-24 ans, hommes et femmes, sont plus nombreux en proportion à Bruxelles (16,9%) et en Wallonie (11,6%), qu'en Flandre (4,7%).

3.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES

On trouve davantage de consommateurs actuels de cannabis auprès des personnes qui n'ont pas de diplôme (6,2%) comparé aux autres catégories d'éducation, mais les analyses ajustées pour l'âge et le sexe révèlent que cette différence par classe sociale (n.s.) serait un artefact démographique. Le gradient social est toutefois bien présent lorsque l'on considère l'usage intensif de cannabis (20+ jours) qui varie de 3,0% parmi les personnes non-diplômées à 0,6% parmi les diplômés du supérieur, une différence qui demeure cette fois significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Spécificités régionales

Bruxelles présente la particularité d'avoir une tendance (n.s) inversée au regard des consommateurs actuels par catégorie d'éducation : ils sont plus nombreux en proportion dans la classe sociale la plus instruite (9,6%).

4. Usage problématique du cannabis

La consommation intensive de cannabis (20+ jours sur les 30 derniers jours, cf. point 3) donne une indication quant à de possibles difficultés liées à cet usage. Cependant pour la première fois en 2018, il est possible d'estimer l'usage problématique du cannabis à partir d'un questionnaire (CAST). L'usage « problématique » d'un produit identifie une consommation susceptible de causer des problèmes de santé et sociaux pouvant affecter l'utilisateur lui-même et/ou son entourage. L'indicateur ID04_1 établit une gradation du risque lié à la consommation problématique (« pas ou peu de risque » ; « risque modéré » ; « risque élevé ») ; ID04_2 renvoie à la prévalence d'un usage problématique (risque modéré ou élevé). La période de référence concerne l'année écoulée et la population est celle âgée de 15 à 64 ans.

4.1. PREVALENCE EN BELGIQUE

En Belgique, 1,3% des citoyens de 15 à 64 ans aurait un risque modéré d'usage problématique du cannabis et 1,8% présenterait un haut risque. Au total, 3,1% de la population de 15-64 ans a donc un usage problématique de cannabis dans les 12 derniers mois.

Spécificités régionales

Les risques modéré et élevé de présenter une consommation problématique de cannabis est plus courant à Bruxelles (respectivement 2,0% et 3,9%) qu'en Flandre (1,3% et 1,4%) et en Wallonie (1,0% et 1,9%).

4.2. EVOLUTION

L'évaluation de l'usage problématique du cannabis a été introduite pour la première fois dans l'enquête de santé en 2018. Aucune comparaison dans le temps n'est possible.


4.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES

L'usage problématique de cannabis (risques modéré et élevé combinés) se rencontre principalement chez les hommes (5,5% contre 0,8% des femmes, différence significative) et chez les adultes (hommes et femmes) de moins de 45 ans en Belgique (de 4,3% à 5,7% selon le groupe d'âge).

Spécificités régionales

La surreprésentation masculine à l'égard de la consommation problématique de cannabis est observée dans les trois régions du pays. Elle est très marquée à Bruxelles : 10,2% des hommes pour 1,6% des femmes étant à risque pour une consommation problématique de cannabis.

Figure 7 | Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui présente un usage problématique de cannabis, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018



Des différences régionales apparaissent pour ce qui concerne les groupes d'âge où l'usage de cannabis est problématique. En Flandre, on notera une consommation problématique moins ancrée qu'ailleurs chez les jeunes de 15-24 ans (2,9%) ; en Wallonie, l'usage problématique est moins fréquent qu'ailleurs parmi les adultes de 35-44 ans (3,0%). A Bruxelles, la consommation problématique perdure dans les classes d'âge plus avancé (7,8% des hommes de 45-54 ans).

4.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES

La consommation problématique de cannabis n'est pas uniformément répartie dans les différentes classes sociales. Les risques d'usage problématique sont plus fréquents aux niveaux d'éducation les moins élevés (p.ex., primaire ou sans diplôme : 7,1% à haut risque) que dans les classes d'éducation supérieures (p.ex. 2,3% à haut risque parmi les diplômés de l'enseignement supérieur).

Spécificités régionales

Un gradient social apparaît à Bruxelles et en Wallonie où environ 9 à 11% des non-diplômés ont une consommation problématique. Il faut toutefois garder en vue les larges intervalles de confiance, qui traduisent de petits nombres pour ces indicateurs au sein des classes sociales moins diplômées. Les différences entre classes d'éducation sont peu marquées en Flandre (n.s.).

4.5. ANALYSES COMPLÉMENTAIRES


L'usage problématique de cannabis est établi sur la période des 12 mois passés. Le tableau ci-dessous (Tableau 1) donne le pourcentage de personnes ayant un usage problématique parmi les consommateurs récents (12 mois), les consommateurs actuels (1 mois) et les consommateurs intensifs (20+ jours/mois). Ainsi parmi les hommes, un peu plus de la moitié des usagers (12 mois) ont une consommation problématique du cannabis et c'est les cas également pour une femme sur cinq. Bien sûr, plus la consommation devient fréquente, plus les proportions des personnes à risque sont importantes : au total, quasiment tous les usagers intensifs présentent un problème lié à leur consommation.

Tableau 1. Pourcentage des personnes ayant une consommation problématique de cannabis, par sexe, au sein des consommateurs récents, actuels et intensifs, Enquête de santé, Belgique 2018

	Hommes	Femmes	Total
	% probl.	% probl.	% probl.
Consommateurs récents	52,4	20,6	43,9
Consommateurs actuels	67,1	31,7	59,1
Consommateurs intensifs	98,8	95,0	98,3

La consommation problématique du cannabis dans les 12 derniers mois est calculée à partir d'une échelle de 6 items (voir questions p.11) traduisant les différentes situations pouvant être liées à un mésusage du produit. La figure ci-dessous présente les fréquences pour chaque item de l'échelle chez les adultes de 15 à 44 ans.

Figure 8 | Pourcentage des consommateurs de 15 à 44 ans qui rapporte dans quelle mesure (de 1= très souvent à 5= jamais) avoir connu les situations problématiques suivantes, Enquête de santé, Belgique 2018



1 = très souvent ; 2 = souvent ; 3 = de temps en temps ; 4 = rarement ; 5 = jamais

En référence à la Figure 8, il apparaît clairement que le comportement potentiellement problématique le plus commun chez les consommateurs est d'utiliser le cannabis en dehors du contexte social et, dans une certaine mesure, avant midi. Peu de consommateurs ont rencontré des problèmes dus à leur consommation, si ce n'est de temps à autre des problèmes mnésiques. Un tiers des consommateurs ont été avisés de réduire leur usage de cannabis, et plus d'un quart avouent ne pas être parvenus à le faire. Les petits nombres de personnes n'autorisent pas des analyses comparatives entre les trois régions du pays.

5. Autres substances psychoactives

Les indicateurs présentés dans cette section reflètent la prévalence d'une vie (ID07_1) et la prévalence-année (ID07_2) relatives à l'usage de substance(s) illicite(s) autre(s) que le cannabis, dont la liste constitue les items du questionnaire (cf. p. 11). Pour faciliter la lecture du rapport, nous ferons référence à ces produits en parlant « d'autres substances », sous-entendu qu'il s'agit de produits (illicites) « autres que le cannabis ». On évoquera « l'expérience » d'une autre substance pour un usage « au cours de l'existence » et on parlera de « consommation récente » pour un usage « au cours des 12 derniers mois ». L'usage « actuel » fait référence aux 30 derniers jours (ID07_3).

5.1. PREVALENCE EN BELGIQUE


On estime que 9,0% de la population âgée de 15 à 64 ans a déjà expérimenté une autre substance au cours de la vie et 2,9% a consommé au moins une de ces substances au cours des 12 derniers mois. En outre, 1,3% déclare avoir consommé dans les 30 derniers jours.

Spécificités régionales

La proportion de personnes ayant fait l'expérience d'autres substances est significativement moins élevée en Région wallonne (6,8%) que dans les deux autres régions, flamande (9,7%) et bruxelloise (11,7%). Cette différence dans la distribution par région prévaut également pour l'usage récent des autres substances : moins fréquente en RW (1,9%) qu'en RF (3,2%) ou RB (4,7%), mais ici seule la différence RW-RB est statistiquement significative. Enfin, l'usage d'autres drogues dans les 30 derniers jours est aussi moins commun en RW (0,5%) qu'en RF (1,6%) et RB (2,1%), une différence statistiquement significative.

5.2. EVOLUTION

Figure 9 | Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant consommé d'autres substances que le cannabis au cours de la vie (ID07_1) et au cours de l'année écoulée (ID07_2), par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018




L'usage expérimental d'autres substances dans la population de 15-64 ans a augmenté en 2018 (à 9,0%) par rapport aux années précédentes, où la prévalence ne dépassait pas les 4%. Le taux d'utilisateurs récents a également connu un accroissement : de moins de 1% en 2013, il est passé à 2,9% en 2018. Une certaine prudence est toutefois de mise dans l'interprétation de cet accroissement, qui pourrait être en partie lié à une modification du questionnaire à l'égard de la consommation des autres drogues. Ces résultats devront être confrontés à d'autres sources d'information sur les stupéfiants en Belgique.

Spécificités régionales

La prévalence des usagers expérimentaux d'autres substances a augmenté de la même façon dans les trois régions du pays. C'est le cas également pour la proportion des usagers récents d'autres substances. A noter que l'écart de prévalences entre la RF et la RW se creuse depuis ces 5 dernières années (Figure 9).

5.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES

Figure 10 | Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que du cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe, par âge et par Région, Enquête de santé, Belgique 2018



Que ce soit pour l'expérience d'une autre drogue ou pour l'usage récent de celle(s)-ci, les hommes sont plus nombreux que les femmes à s'y adonner, d'une part, et les âges de prédilection se situent entre 25 et 44 ans. En Belgique, un jeune homme adulte sur dix (de 25-34 ans) a pris une drogue autre que le cannabis au cours de l'année écoulée (contre 1,9% des femmes de cet âge). Les consommateurs actuels sont aussi plus souvent des hommes entre 25 et 34 ans (4,2%).

Spécificités régionales

En Région bruxelloise, la proportion de femmes consommatrices d'autres substances est plus élevée qu'ailleurs parmi les jeunes de 15-24 ans, et surtout de 25-34 ans. Chez les hommes, ils sont encore proportionnellement assez nombreux en RB à consommer une autre substance au-delà de 44 ans (5,6%), ce qui est moins souvent le cas dans les autres régions.

5.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES

Contrairement au cannabis, on ne trouve pas de gradient socio-éducatif dans l'expérience, l'usage récent et l'usage actuel d'autres substances psychoactives, tant au niveau national que dans chacune des trois régions.

6. Substances utilisées dans l'année

Cette section du rapport sur l'usage de drogues a trait aux consommateurs récents (12 derniers mois) au sein de la population âgée de 15 à 64 ans en fonction de la substance particulière utilisée. Etant donné les petits nombres d'individus concernés dans l'échantillon de l'enquête, les données seront présentées de manière succincte. Les analyses par âge et par sexe ne seront réalisées qu'au niveau national, non pas au niveau des régions. Les tableaux de base (en fin de rapport) sont produits pour autant que les substances soient utilisées par plus d'un pourcent de la population sous étude (soit la cocaïne et l'ecstasy ; Tableau 2).

6.1. PREVALENCE EN BELGIQUE

En 2018, 1,5% des citoyens âgés de 15 à 64 ans ont pris de la cocaïne (2,6% des hommes et 0,4% des femmes) et 1,2% ont pris de l'ecstasy (1,9% des hommes et 0,5% des femmes) dans les 12 mois qui ont précédé l'enquête. Ces substances intéressent en plus grand nombre relatif les adultes de 25-34 ans (3,7% consomment de la cocaïne et 3,0% de l'ecstasy), bien qu'elles soient également utilisées dès 15-24 ans (par 1,8% des jeunes de cette tranche d'âge pour chacune de ces substances) et plus tard chez les adultes de 35-44 ans (2,0% utilisent la cocaïne et 1,3% l'ecstasy).

Tableau 2 | Pourcentage de la population de 15-64 ans qui a consommé une des substances dans la liste au cours des 12 derniers mois, par sexe et dans trois groupes d'âge, Enquête de santé, Belgique 2018

	Total (%)	Hommes (%)	Femmes (%)	15-24 ans (%)	25-34 ans (%)	35-44 ans (%)
Cocaïne	1,5	2,6	0,4	1,8	3,7	2,0
Ecstasy	1,2	1,9	0,5	1,8	3,0	1,3
Opioides	0,6	0,6	0,7	0,4	0,7	1,1
Hallucinogènes	0,5	0,7	0,3	1,2	0,6	0,7
Amphétamines	0,4	0,8	0,01	0,5	1,0	0,5
Kétamine	0,4	0,7	0,1	1,5	0,6	0,3
NSP *	0,3	0,4	0,2	1,1	0,4	0,2
Métamphétamines	0,1	0,2	0,0	0,6	0,05	0,07
GBL/GHB	0,04	0,04	0,04	0,0	0,1	0,1
Héroïne	0,07	0,1	0,0	0,0	0,0	0,03
Crack	0,006	0,01	0,0	0,0	0,0	0,02

* NSP=Nouvelles Substances Psychoactives

Le tableau 2 montre que, à l'exception des opioïdes non-prescrits, l'utilisation des stupéfiants au cours des 12 derniers mois rentre dans le schéma classique où elle prévaut chez les hommes, d'une part, et chez les jeunes adultes (15-34 ans), d'autre part.

6.2. SPÉCIFICITÉS RÉGIONALES

Bien qu'il faille interpréter les chiffres avec une certaine réserve en raison des petits nombres, la tendance qui se dégage au regard du tableau 3 est celle d'une concentration plus importante de consommateurs de stupéfiants de tous types (excepté les opioïdes) en Région bruxelloise et généralement une plus faible représentation de ceux-ci en Région wallonne, la Flandre ayant une position intermédiaire.

Tableau 3 | Pourcentage de la population de 15-64 ans qui a consommé une des substances listées au cours des 12 derniers mois, en Belgique et par région, Enquête de santé, Belgique 2018


	Belgique (%)	Flandre (%)	Bruxelles (%)	Wallonie (%)
Cocaïne	1,5	1,7	2,9	0,7
Ecstasy	1,2	1,3	2,5	0,6
Opioides	0,6	0,7	0,2	0,6
Hallucinogènes	0,5	0,5	1,2	0,2
Amphétamines	0,4	0,4	0,6	0,4
Kétamines	0,4	0,5	0,6	0,2
NSP*	0,3	0,3	0,06	0,5
Métamphétamines	0,1	0,06	0,1	0,2

* NSP=Nouvelles Substances Psychoactives

6.3. EVOLUTION

Il a été possible d'observer l'évolution de la consommation de certaines substances lorsque l'information a été collectée dans les enquêtes de santé antérieures, mais il faut néanmoins garder à l'esprit que le questionnaire a été modifié, ce qui pourrait avoir influencé les résultats.

Figure 11 | Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant consommé une drogue au cours des 12 derniers mois, par substance et par année, Enquête de santé, Belgique 2018



Toutefois, les résultats vont dans le même sens que pour la consommation de cannabis, un indicateur pour lequel le questionnaire était identique d'une année d'enquête à l'autre. Ainsi, quelle que soit la substance, les résultats (Figure 11) montrent une augmentation du nombre de consommateurs au sein de la population générale de Belgique âgée de 15-64 ans de 2013 à 2018. Sauf pour ce qui concerne l'héroïne, la prévalence atteint, voire dépasse, les estimations obtenues en 2008.

7. Polyconsommation dans l'année

L'indicateur de polyconsommation fait référence dans ce rapport aux personnes qui ont indiqué avoir consommé plusieurs substances différentes – en cela inclus le cannabis – au cours de l'année écoulée. Il ne s'agit donc pas de la consommation de différentes substances au même moment.

7.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE

La polyconsommation dans les 12 mois écoulés concerne 2,4% de la population belge âgée de 15 à 64 ans.


Spécificités régionales

Les polyconsommateurs sont proportionnellement plus nombreux parmi les Bruxellois (4,8%) que parmi les résidents flamants (2,4%) et wallons (1,6%), et cette différence est significative même après standardisation.

7.2. EVOLUTION

La polyconsommation a augmenté par rapport à 2013 (0,5%), mais aussi par rapport à 2008 (1,2%).

Figure 12 | Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant une polyconsommation au cours des 12 derniers mois, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018




Spécificités régionales

La polyconsommation a augmenté dans les trois régions du pays.

7.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES

Les hommes sont plus enclins que les femmes à la polyconsommation de drogues (respectivement 4,0% et 0,8% de polyconsommateurs) et c'est entre 25 et 34 ans d'âge qu'ils sont les plus nombreux à la pratiquer puisque quasiment un homme sur dix de cet âge (9,4%) est polyconsommateur.

Figure 13 | Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant une polyconsommation au cours des 12 derniers mois, par sexe, par âge et par Région, Enquête de santé, Belgique 2018



Spécificités régionales

Les courbes régionales des taux de polyconsommation par âge et sexe sont similaires à celles décrites au niveau national, si ce n'est qu'à Bruxelles la prévalence de la polyconsommation parmi les jeunes femmes de 15-24 ans (4,5%), et surtout de 25-34 ans (9,0%) est plus élevée qu'ailleurs. En Wallonie, les taux sont plus bas que dans les autres régions pour tous les âges et sexes.

7.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES

Les analyses ne mettent pas en évidence un gradient social dans les comportements de polyconsommation en Belgique qui soit significatif au plan statistique.

Spécificités régionales

On relève toutefois à Bruxelles une proportion plus importante de polyconsommateurs avec une augmentation du niveau d'éducation. Après standardisation, la différence entre les moins et les plus diplômés reste statistiquement significative (0,7% – vs – 5,9%, $p=0,03$).

8. Tableaux de synthèse

Tableau 4. Evolution de l'usage des drogues en Belgique de 2001 à 2018

	2001	2004	2008	2013	2018
Pourcentage de la population de 15-64 ans qui a consommé ...					
• Du cannabis au moins une fois dans sa vie	10,7	13,0	14,3	15,0	22,6
• Du cannabis au cours des 12 derniers mois	-	5,0	5,1	4,6	7,0
• Du cannabis au cours des 30 derniers jours	2,7	2,8	3,1	2,6	4,3
• Du cannabis de manière intensive (20+/30 jours)	-	0,8	0,9	0,5	1,3
• Du cannabis de manière problématique (avec risques)	-	-	-	-	3,1
Pourcentage de la population de 15-64 ans qui a consommé ...					
• D'autres substances au moins une fois dans sa vie	-	-	3,9	3,6	9,0
• D'autres substances au cours des 12 derniers mois	-	-	1,5	0,8	2,9
• D'autres substances au cours des 30 derniers jours	-	-	-	-	1,3
• De la cocaïne au cours des 12 derniers mois	-	-	0,9	0,5	1,5
• De l'ecstasy au cours des 12 derniers mois	-	-	0,6	0,3	1,2

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018

Tableau 5. Evolution de l'usage des drogues en Région flamande de 2001 à 2018

	2001	2004	2008	2013	2018
Pourcentage de la population de 15-64 ans qui a consommé ...					
• Du cannabis au moins une fois dans sa vie	10,6	12,2	13,4	14,1	21,8
• Du cannabis au cours des 12 derniers mois	-	4,6	4,6	3,5	6,2
• Du cannabis au cours des 30 derniers jours	2,3	2,4	2,8	1,7	3,6
• Du cannabis de manière intensive (20+/30 jours)	-	0,7	0,8	0,4	1,1
• Du cannabis de manière problématique (avec risques)	-	-	-	-	2,7
Pourcentage de la population de 15-64 ans qui a consommé ...					
• D'autres substances au moins une fois dans sa vie	-	-	3,7	3,8	9,7
• D'autres substances au cours des 12 derniers mois	-	-	1,6	0,8	3,2
• D'autres substances au cours des 30 derniers jours	-	-	-	-	1,6
• De la cocaïne au cours des 12 derniers mois	-	-	0,8	0,4	1,7
• De l'ecstasy au cours des 12 derniers mois	-	-	0,7	0,2	1,3

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018

Tableau 6. Evolution de l'usage des drogues en Région bruxelloise de 2001 à 2018

	2001	2004	2008	2013	2018
Pourcentage de la population de 15-64 ans qui a consommé ...					
• Du cannabis au moins une fois dans sa vie	17,8	21,9	23,4	22,0	30,2
• Du cannabis au cours des 12 derniers mois	-	9,2	8,6	8,1	12,4
• Du cannabis au cours des 30 derniers jours	5,2	4,8	6,3	5,2	8,2
• Du cannabis de manière intensive (20+/30 jours)	-	1,6	2,2	1,2	2,0
• Du cannabis de manière problématique (avec risques)	-	-	-	-	5,8
Pourcentage de la population de 15-64 ans qui a consommé ...					
• D'autres substances au moins une fois dans sa vie	-	-	6,0	5,6	11,7
• D'autres substances au cours des 12 derniers mois	-	-	2,2	2,5	4,7
• D'autres substances au cours des 30 derniers jours	-	-	-	-	2,1
• De la cocaïne au cours des 12 derniers mois	-	-	1,6	1,8	3,0
• De l'ecstasy au cours des 12 derniers mois	-	-	0,8	1,6	2,5

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018

Tableau 7. Evolution de l'usage des drogues en Région wallonne de 2001 à 2018

	2001	2004	2008	2013	2018
Pourcentage de la population de 15-64 ans qui a consommé ...					
• Du cannabis au moins une fois dans sa vie	8,6	12,1	13,3	14,8	22,0
• Du cannabis au cours des 12 derniers mois	-	4,6	4,9	5,8	6,8
• Du cannabis au cours des 30 derniers jours	2,8	3,0	2,7	3,6	4,5
• Du cannabis de manière intensive (20+/30 jours)	-	0,9	0,8	0,7	1,5
• Du cannabis de manière problématique (avec risques)	-	-	-	-	2,9
Pourcentage de la population de 15-64 ans qui a consommé ...					
• D'autres substances au moins une fois dans sa vie	-	-	3,6	2,6	6,8
• D'autres substances au cours des 12 derniers mois	-	-	1,3	0,4	1,9
• D'autres substances au cours des 30 derniers jours	-	-	-	-	0,5
• De la cocaïne au cours des 12 derniers mois	-	-	0,9	0,2	0,7
• De l'ecstasy au cours des 12 derniers mois	-	-	0,6	0,2	0,6

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018

SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS

Usage du cannabis

Plusieurs indicateurs concernant l'usage du cannabis font partie de l'enquête belge depuis 2001 et permettent ainsi l'observation des tendances temporelles qui se dessinent au sein de la population âgée de 15 à 64 ans. Il s'agit par leur biais d'estimer le pourcentage de personnes ayant fait l'expérience du cannabis au cours de la vie, de celles ayant consommé au cours des 12 mois (consommation récente) et au cours des 30 jours (usage actuel) précédant l'enquête, la fréquence d'usage (nombre de jours sur les 30 derniers), ainsi que l'âge au moment de la première expérience avec cette drogue. Une nouvelle série de questions a été ajoutée dans l'enquête de 2018 afin d'évaluer le risque d'un usage problématique, c.-à-d. témoignant d'une perte de contrôle relative de l'usage, dont les conséquences se révéleraient néfastes pour le consommateur ou son entourage.

Les résultats de l'enquête de 2018 indiquent que plus d'un citoyen belge sur cinq (22,6%) de 15-64 ans a fait l'expérience du cannabis au cours de la vie. L'âge moyen au moment de l'initiation au cannabis est 19,2 ans. Pour un peu plus de deux tiers (69,0%) de ceux qui ont essayé le cannabis, cette expérience remonte à plus de 12 mois, ce qui laisse présager l'abandon de la consommation. Néanmoins, 7,0% des personnes de 15-64 ans ont utilisé du cannabis dans l'année écoulée, 4,3% en ont consommé au cours des 30 derniers jours et 1,3% s'avèrent être des consommateurs intensifs (20 jours ou plus d'usage au cours des 30 derniers). Ces valeurs sont très proches des moyennes européennes : selon le rapport de l'OEDT de 2019 (1), 27,4% des européens âgés de 15 à 64 ans ont consommé du cannabis au cours de la vie, 7,4% en ont consommé au cours de l'année écoulée et 1% seraient des consommateurs (quasi-)quotidiens (20+/30 jours). Les données belges indiquent en outre qu'en 2018, 3,1% de la population adulte (15-64 ans) peut être considéré comme étant de potentiels consommateurs problématiques au vu des situations rencontrées, telles que consommer avant midi ou seul(e), éprouver des problèmes de mémoire, avoir été avisé de diminuer leur consommation et/ou ne pas parvenir à le faire.

Usage d'autres substances

Le questionnaire de l'enquête de santé 2018 s'est penché, pour chaque type de substance listé, sur le moment où il fut utilisé pour la dernière fois (le cas échéant), soit : dans les 30 derniers jours, dans les 12 mois écoulés, au-delà de 12 mois, voire jamais. Pour ce qui concerne l'ensemble des substances, les données révèlent que 9,0% de la population âgée de 15 à 64 ans a déjà expérimenté une substance illicite autre que le cannabis, 2,9% a consommé au moins une de ces substances au cours des 12 derniers mois et 1,3% en a consommé dans les 30 derniers jours. Si l'on s'en tient à l'usage récent (12 mois), la plus populaire des drogues est la cocaïne (1,5%) suivi de l'ecstasy (1,2%) ; les autres substances n'atteignent pas 1% de consommateurs dans la population adulte (15-64 ans). La polyconsommation de drogues dans l'année écoulée concerne quant à elle 2,4% de la population de 15-64 ans. Il s'agit ici d'individus qui ont pris plusieurs types de substances différentes au cours des 12 derniers mois, y compris éventuellement du cannabis.

Profil des consommateurs

Les hommes sont davantage attirés par les substances psychoactives que les femmes. Ils sont par exemple trois fois plus nombreux à avoir consommé du cannabis ou un autre produit illicite dans les 12 mois écoulés, soit 10,4% d'hommes contre 3,7% de femmes pour le cannabis et 4,5% contre 1,4% pour les autres substances. La surreprésentation masculine est observée pour tous les indicateurs étudiés.

L'âge de prédilection pour l'usage du cannabis se situe entre 15 et 34 ans : ici, pas moins de 19,5% des hommes de ces (deux) groupes d'âge ont consommé dans les 12 derniers mois, contre 10,9% des femmes de 15-24 ans et 5,6% de celles de 25-34 ans. La consommation intensive de cannabis (20 jours ou plus sur les 30 derniers jours) est plus souvent observée chez les hommes un peu plus âgés : 5,2% des 25-34 ans et 3,2% des 35-44 ans (contre 1,8% des jeunes de 15-24 ans). La consommation problématique est d'ailleurs

relativement importante chez les hommes, puisqu'elle touche jusqu'à 10,5% de ceux de 25-34 ans, tandis que les femmes sont peu concernées (<1%).

Les données de consommation n'ont pas dévoilé un schéma socio-économique explicite et identique pour tous les types de substances ou pour toutes les régions du pays.

Evolution

Les résultats de l'enquête 2018 mettent en exergue le fait qu'en Belgique, comme dans de nombreux autres pays européens (1), les chiffres de consommation du cannabis et autres substances illicites sont en augmentation par rapport aux années précédentes. Cette hausse fait suite à une période de stabilité, voire de diminution progressive du nombre des consommateurs en Belgique durant la première quinzaine d'années du 21^{ème} siècle, comme dans l'ensemble de l'Europe, du reste. Nonobstant, les prévalences n'ont jamais été aussi élevées dans notre pays qu'en 2018 et ce, depuis les premières estimations réalisées en 2001, qu'il s'agisse de l'usage du cannabis, des autres substances ou de la polyconsommation.

Ainsi on observe entre 2013 et 2018 une progression de plus de 30% d'individus ayant fait l'expérience du cannabis (passant de 15,0% à 22,6%) ou ayant fait un usage récent de celui-ci (passant de 4,6% à 7,0%). La part de la population de 15 à 64 ans qui a déjà essayé d'autres substances illicites a plus que doublé entre 2013 et 2018 (passant de 3,9% à 9,0%), de même que la prévalence de consommation dans l'année (de 0,8% en 2013 à 2,9% en 2018). Cette tendance se dessine à chaque type de produit pour lequel une comparaison dans le temps est possible. Des analyses ciblées indiquent que l'accroissement de ces valeurs serait surtout dû à la propagation de l'usage des substances parmi les hommes entre 15 et 44 ans.

Diversité régionale

Si l'usage des drogues est en augmentation dans les trois régions de Belgique, il en est une où le pourcentage de consommateurs demeure significativement plus élevé qu'ailleurs, la Région Bruxelloise. Ici, plus d'une personne sur huit de 15-64 ans a récemment consommé du cannabis (12,4%) et une personne sur douze (8,2%) en a consommé dans le dernier mois. En outre, 11,7% a déjà essayé une autre substance psychoactive, 4,7% est un usager récent (12 mois) d'au moins une substance et 4,8% est polyconsommateur récent. Cela reflète peut-être une offre plus variée du marché des produits illicites dans les grandes villes cosmopolites, ainsi qu'une accessibilité plus aisée à ceux-ci.

Implication pour les politiques de santé

En préambule à cette section, il est important de souligner que les données issues des enquêtes de santé offrent une vision plutôt optimiste de la consommation de stupéfiants sur notre territoire, dans le sens qu'elles sont réalisées dans la population générale, c'est-à-dire auprès de ménages privés, non-institutionnalisés, volontaires et aptes à participer. Or la majorité des toxicomanes et des usagers problématiques en phase de déstructuration se trouve hors du cadre conventionnel d'échantillonnage de l'enquête, soit par exemple dans un centre thérapeutique, de désintoxication, en hébergement spécialisé, dans un hôpital psychiatrique, ou alors dans un centre de détention, en prison, ou sans domicile. Il convient dès lors de replacer les résultats de l'enquête dans un contexte plus large et se tourner vers d'autres sources de données disponibles en Belgique afin d'évaluer la situation des drogues dans toute son ampleur : par exemple, en se basant également sur les études en milieu carcéral ou en milieu festif, l'analyse des eaux usées, les registres des urgences ou des hospitalisations, les registres de demande de traitement dans les structures spécialisées (TDI), etc. L'enquête comme source d'information a toutefois l'avantage de pouvoir estimer la part des citoyens tentés par l'expérience des substances psychoactives, ceux qui ne consomment plus et ceux qui consomment toujours et, concernant plus particulièrement le cannabis, ceux qui en prennent de manière régulière, intensive ou problématique.

Les jeunes adultes constituent un public cible pour la sensibilisation et la prévention des risques liés à l'utilisation du cannabis et d'autres substances illicites. Pour l'heure, le constat est que les politiques mises en place ne dissuadent pas les jeunes adultes de s'engager dans la consommation de produits psychoactifs

illicites, que du contraire : leur usage est plus élevé aujourd'hui que lors des 15 dernières années, et ce, quelle que soit la substance considérée. Bien sûr, de nombreux déterminants peuvent être à l'œuvre dans cette augmentation et la réponse devra pour lors être multifactorielle, adressant à la fois l'offre (la disponibilité et l'accès aux produits) et la demande de drogues (perception des risques, développement de compétences sociales et structures d'aide), dans une stratégie globale. Etant donné que l'interdiction légale de consommer ces produits n'a qu'une portée limitée, il faut certainement diffuser des messages clairs sur leur dangerosité et poursuivre les initiatives de contrôle des produits qui circulent dans une optique de réduction des risques. Il semble tout aussi essentiel de maintenir et promouvoir des structures d'aide et de traitement spécialisées dans la problématique des dépendances et des assuétudes. Il n'est pas de notre ressort, loin s'en faut, d'offrir des interventions clé-sur-porte (puissent-elles exister). Nous pouvons, tout au plus, attirer l'attention des autorités sur l'évolution actuelle de l'usage des drogues dans la population belge afin de justifier une réorientation des stratégies engagées.

Pour aller plus loin....

- OEDT (2019). Rapport européen sur les drogues 2019 : tendances et évolutions.
 - http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001FRN_PDF.pdf
- WHO (2016). The health and social effects of nonmedical cannabis use.
 - https://www.who.int/substance_abuse/publications/msbcannabis.pdf
- OEDT. Réponses sanitaires et sociales apportées aux problèmes de drogues : un guide européen.
 - <http://www.emcdda.europa.eu/responses-guide>
- Portail des bonnes pratiques dans le domaine de la prévention, du traitement, de la réduction des dommages et de la réinsertion sociale des usagers. Site web de l'OEDT :
 - http://www.emcdda.europa.eu/best-practice_fr
- Eurotox (2016). RDR – Bonnes pratiques en réduction des risques liés aux drogues.
 - <https://eurotox.org/2016/12/19/livret-thematique-sur-les-bonnes-pratiques-en-reduction-des-risques/>
- Eurotox (2017). Bonnes pratiques en matière d'aide et de soins.
 - <https://eurotox.org/2018/03/14/livret-thematique-sur-les-bonnes-pratiques-en-matiere-daide-et-de-soins/>
- Eurotox : Tableaux de bord 2018 de l'usage de drogues et ses conséquences socio-sanitaires :µ
 - <https://eurotox.org/2019/02/28/tableaux-de-bord-2018-de-lusage-de-drogues-et-ses-consequences-socio-sanitaires/>

RÉFÉRENCES



- (1) Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (2019). Rapport européen sur les drogues 2019: Tendances et évolutions. Luxembourg: Office des publications de l'Union européenne.
- (2) van Caloen, B (2004). Dilemmes de l'individualisme : un contexte sociétaire de l'usage de drogues. *Drogues, santé et société*, 3 (1), 69–86. <https://doi.org/10.7202/010520ar>.
- (3) European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2002). Handbook for surveys on drug use among the general population. Lisbon: Report No: EMCDDA project CT.99.EP.08 B.
- (4) Beck F, Legleye S (2008). Measuring cannabis related problems and dependence at the population level. In: *A Cannabis Reader: global issues and local experiences*, vol.II, EMCDDA monograph, European Monitoring Center on Drug and Drug Addiction (EMCDDA), p. 29-57.

LISTE DES TABLEAUX

Tableau B 1.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a déjà consommé du cannabis au cours de son existence, Belgique	37
Tableau B 2.	Age moyen à la première consommation de cannabis dans la population de 15 à 64 ans, Belgique.....	38
Tableau B 3.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, Belgique	39
Tableau B 4.	Pourcentage des consommateurs de cannabis de 15 à 64 ans qui n'en ont pas consommé au cours des 12 derniers mois, Belgique	40
Tableau B 5.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours, Belgique	41
Tableau B 6.	Distribution (%) de la population 15 à 64 ans ayant consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours selon leur fréquence de consommation*, Belgique.....	42
Tableau B 7.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé intensivement (20+ jours) du cannabis au cours des 30 derniers jours, Belgique.....	43
Tableau B 8.	Distribution (%) de la population de 15 à 64 ans selon le risque d'usage problématique du cannabis au cours des 12 derniers mois, Belgique	44
Tableau B 9.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant présenté une consommation problématique de cannabis au cours des 12 derniers mois, Belgique	45
Tableau B 10.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a déjà consommé une drogue autre que le cannabis au cours de son existence, Belgique	46
Tableau B 11.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le cannabis au cours des 12 derniers mois, Belgique	47
Tableau B 12.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le cannabis au cours des 30 derniers jours, Belgique.....	48
Tableau B 13.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé de la cocaïne au cours des 12 derniers mois, Belgique	49
Tableau B 14.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé de l'ecstasy au cours des 12 derniers mois, Belgique	50
Tableau B 15.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé différents types de drogues au cours des 12 derniers mois, Belgique	51
Tableau B 16.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a déjà consommé du cannabis au cours de son existence, Région flamande	52
Tableau B 17.	Age moyen à la première consommation de cannabis dans la population de 15 à 64 ans, Région flamande	53
Tableau B 18.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, Région flamande.....	54
Tableau B 19.	Pourcentage des consommateurs de cannabis de 15 à 64 ans qui n'en ont pas consommé au cours des 12 derniers mois, Région flamande.....	55
Tableau B 20.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours, Région flamande.....	56
Tableau B 21.	Distribution (%) de la population 15 à 64 ans ayant consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours selon leur fréquence de consommation*, Région flamande	57

Tableau B 22.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé intensivement (20+ jours) du cannabis au cours des 30 derniers jours, Région flamande	58
Tableau B 23.	Distribution (%) de la population de 15 à 64 ans selon le risque d'usage problématique du cannabis au cours des 12 derniers mois, Région flamande.....	59
Tableau B 24.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant présenté une consommation problématique de cannabis au cours des 12 derniers mois, Région flamande	60
Tableau B 25.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a déjà consommé une drogue autre que le cannabis au cours de son existence, Région flamande	61
Tableau B 26.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le cannabis au cours des 12 derniers mois, Région flamande.....	62
Tableau B 27.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le cannabis au cours des 30 derniers jours, Région flamande	63
Tableau B 28.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé de la cocaïne au cours des 12 derniers mois, Région flamande	64
Tableau B 29.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé de l'ecstasy au cours des 12 derniers mois, Région flamande	65
Tableau B 30.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé différents types de drogues au cours des 12 derniers mois, Région flamande.....	66
Tableau B 31.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a déjà consommé du cannabis au cours de son existence, Région bruxelloise.....	67
Tableau B 32.	Age moyen à la première consommation de cannabis dans la population de 15 à 64 ans, Région bruxelloise.....	68
Tableau B 33.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise	69
Tableau B 34.	Pourcentage des consommateurs de cannabis de 15 à 64 ans qui n'en ont pas consommé au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise	70
Tableau B 35.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours, Région bruxelloise	71
Tableau B 36.	Distribution (%) de la population 15 à 64 ans ayant consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours selon leur fréquence de consommation*, Région bruxelloise.....	72
Tableau B 37.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé intensivement (20+ jours) du cannabis au cours des 30 derniers jours, Région bruxelloise	73
Tableau B 38.	Distribution (%) de la population de 15 à 64 ans selon le risque d'usage problématique du cannabis au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise	74
Tableau B 39.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant présenté une consommation problématique de cannabis au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise	75
Tableau B 40.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a déjà consommé une drogue autre que le cannabis au cours de son existence, Région bruxelloise.....	76
Tableau B 41.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le cannabis au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise	77
Tableau B 42.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le cannabis au cours des 30 derniers jours, Région bruxelloise.....	78
Tableau B 43.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé de la cocaïne au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise	79
Tableau B 44.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé de l'ecstasy au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise	80

Tableau B 45. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé différents types de drogues au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise	81
Tableau B 46. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a déjà consommé du cannabis au cours de son existence, Région wallonne.....	82
Tableau B 47. Age moyen à la première consommation de cannabis dans la population de 15 à 64 ans, Région wallonne.....	83
Tableau B 48. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, Région wallonne	84
Tableau B 49. Pourcentage des consommateurs de cannabis de 15 à 64 ans qui n'en ont pas consommé au cours des 12 derniers mois, Région wallonne	85
Tableau B 50. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours, Région wallonne	86
Tableau B 51. Distribution (%) de la population 15 à 64 ans ayant consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours selon leur fréquence de consommation*, Région wallonne.....	87
Tableau B 52. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé intensivement (20+ jours) du cannabis au cours des 30 derniers jours, Région wallonne	88
Tableau B 53. Distribution (%) de la population de 15 à 64 ans selon le risque d'usage problématique du cannabis au cours des 12 derniers mois, Région wallonne	89
Tableau B 54. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant présenté une consommation problématique de cannabis au cours des 12 derniers mois, Région wallonne	90
Tableau B 55. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a déjà consommé une drogue autre que le cannabis au cours de son existence, Région wallonne.....	91
Tableau B 56. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le cannabis au cours des 12 derniers mois, Région wallonne	92
Tableau B 57. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le cannabis au cours des 30 derniers jours, Région wallonne	93
Tableau B 58. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé de la cocaïne au cours des 12 derniers mois, Région wallonne	94
Tableau B 59. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé de l'ecstasy au cours des 12 derniers mois, Région wallonne	95
Tableau B 60. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé différents types de drogues au cours des 12 derniers mois, Région wallonne	96

Tableau B 1. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a déjà consommé du cannabis au cours de son existence, Belgique

ID01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	28,1	(25,7-30,5)	26,5	(24,2-29,1)	2773
	Femme	17,3	(15,5-19,1)	15,5	(13,8-17,4)	3023
GROUPE D'AGE	15 - 24	25,7	(21,4-29,9)	25,0	(21,0-29,4)	708
	25 - 34	38,1	(33,9-42,3)	38,0	(33,8-42,4)	1027
	35 - 44	29,7	(26,3-33,1)	29,2	(25,9-32,7)	1271
	45 - 54	14,0	(11,5-16,6)	13,6	(11,3-16,2)	1408
	55 - 64	8,8	(6,6-11,0)	8,5	(6,6-10,9)	1382
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	14,5	(7,7-21,4)	13,6	(8,0-22,1)	189
	Secondaire inférieur	16,3	(11,6-21,0)	15,9	(11,7-21,2)	528
	Secondaire supérieur	19,1	(16,2-22,0)	16,8	(14,2-19,7)	1764
	Enseignement supérieur	26,1	(23,9-28,3)	23,7	(21,5-26,0)	3214
REGION	Région flamande	21,8	(19,5-24,0)	19,8	(17,7-22,1)	2303
	Région bruxelloise	30,2	(27,2-33,2)	25,7	(22,8-28,9)	1380
	Région wallonne	22,0	(19,2-24,7)	20,1	(17,5-23,1)	2113
ANNEE	2001	10,7	(9,6-11,7)	7,6	(6,8-8,5)	7335
	2004	13,0	(11,8-14,3)	9,8	(8,8-10,9)	6655
	2008	14,3	(13,0-15,7)	11,3	(10,2-12,5)	5549
	2013	15,0	(13,4-16,5)	12,1	(10,8-13,5)	4931
	2018	22,6	(21,0-24,2)	19,7	(18,1-21,4)	5796

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 2. Age moyen à la première consommation de cannabis dans la population de 15 à 64 ans, Belgique

ID02_1		Moyenne brut	CI 95% brut	Moyenne stand*	CI 95% stand	N
SEXE	Homme	18,8	(18,4-19,3)	20,0	(19,2-20,7)	746
	Femme	19,9	(19,0-20,7)	21,1	(20,0-22,2)	566
GROUPE D'AGE	15 - 24	16,8	(16,4-17,1)	16,9	(16,6-17,3)	185
	25 - 34	17,9	(17,5-18,3)	18,0	(17,6-18,4)	389
	35 - 44	18,5	(18,1-19,0)	18,7	(18,2-19,2)	391
	45 - 54	23,4	(21,5-25,3)	23,6	(21,6-25,6)	221
	55 - 64	24,6	(21,5-27,8)	24,7	(21,6-27,9)	126
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	17,7	(16,1-19,4)	18,9	(16,7-21,0)	25
	Secondaire inférieur	18,6	(16,8-20,5)	20,2	(18,6-21,9)	71
	Secondaire supérieur	18,8	(17,9-19,7)	20,2	(19,0-21,3)	316
	Enseignement supérieur	19,5	(18,9-20,1)	20,7	(19,8-21,6)	874
REGION	Région flamande	19,2	(18,6-19,9)	20,5	(19,7-21,4)	480
	Région bruxelloise	19,0	(18,5-19,5)	20,3	(19,7-21,0)	395
	Région wallonne	19,3	(18,3-20,4)	20,6	(19,4-21,8)	437
ANNEE	2004	19,2	(18,7-19,7)	21,7	(21,1-22,4)	888
	2008	19,0	(18,4-19,5)	21,1	(20,4-21,9)	860
	2013	18,4	(17,9-18,9)	20,7	(20,0-21,4)	753
	2018	19,2	(18,7-19,7)	20,6	(19,9-21,2)	1312

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 3. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, Belgique

ID03_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	10,4	(8,7-12,0)	7,0	(5,8-8,5)	2770
	Femme	3,7	(2,9-4,5)	2,3	(1,8-3,1)	3020
GROUPE D'AGE	15 - 24	15,5	(11,8-19,2)	13,9	(10,7-17,7)	708
	25 - 34	12,2	(9,3-15,1)	11,2	(8,8-14,2)	1026
	35 - 44	8,0	(5,9-10,1)	7,1	(5,5-9,2)	1269
	45 - 54	2,0	(1,1-2,8)	1,7	(1,1-2,7)	1405
	55 - 64	0,8	(0,3-1,2)	0,7	(0,3-1,2)	1382
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	7,4	(2,6-12,1)	3,9	(1,8-8,6)	189
	Secondaire inférieur	6,4	(3,2-9,5)	4,4	(2,6-7,4)	527
	Secondaire supérieur	6,8	(5,0-8,6)	3,8	(2,8-5,1)	1763
	Enseignement supérieur	7,1	(5,9-8,4)	4,1	(3,2-5,2)	3210
REGION	Région flamande	6,2	(5,0-7,5)	3,7	(2,9-4,8)	2300
	Région bruxelloise	12,4	(10,1-14,7)	7,0	(5,4-9,0)	1379
	Région wallonne	6,8	(4,9-8,6)	4,0	(3,0-5,3)	2111
ANNEE	2004	5,0	(4,3-5,8)	2,6	(2,2-3,1)	6636
	2008	5,1	(4,2-5,9)	2,7	(2,2-3,4)	5534
	2013	4,6	(3,6-5,5)	2,5	(2,0-3,2)	4925
	2018	7,0	(6,0-7,9)	4,0	(3,4-4,8)	5790

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 4. Pourcentage des consommateurs de cannabis de 15 à 64 ans qui n'en ont pas consommé au cours des 12 derniers mois, Belgique

ID03_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	63,0	(58,2-67,9)	69,9	(64,7-74,7)	753
	Femme	78,5	(74,0-83,0)	84,9	(80,2-88,7)	567
GROUPE D'AGE	15 - 24	39,8	(30,1-49,5)	41,9	(32,4-52,1)	186
	25 - 34	67,8	(61,2-74,5)	70,0	(63,3-76,0)	392
	35 - 44	72,9	(66,5-79,2)	76,1	(69,9-81,5)	393
	45 - 54	85,7	(79,6-91,9)	88,1	(81,0-92,8)	222
	55 - 64	91,4	(86,1-96,8)	92,5	(86,2-96,1)	127
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	49,5	(23,9-75,0)	66,0	(26,2-91,4)	25
	Secondaire inférieur	60,9	(45,4-76,5)	75,4	(59,6-86,5)	73
	Secondaire supérieur	64,5	(56,5-72,5)	74,9	(67,5-81,1)	319
	Enseignement supérieur	72,5	(68,2-76,7)	81,1	(76,3-85,1)	877
REGION	Région flamande	71,3	(66,2-76,3)	79,9	(74,4-84,5)	485
	Région bruxelloise	58,8	(52,8-64,9)	68,2	(60,7-74,8)	395
	Région wallonne	69,0	(62,0-75,9)	79,6	(73,4-84,7)	440
ANNEE	2004	60,7	(55,8-65,5)	73,3	(68,2-77,8)	902
	2008	63,6	(58,8-68,3)	74,5	(69,2-79,1)	870
	2013	69,1	(63,9-74,3)	79,9	(75,0-84,0)	762
	2018	69,0	(65,3-72,6)	75,9	(72,3-79,1)	1320

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 5. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours, Belgique

ID05_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	6,7	(5,4-8,1)	4,5	(3,6-5,7)	2769
	Femme	1,9	(1,3-2,5)	1,2	(0,8-1,8)	3020
GROUPE D'AGE	15 - 24	8,3	(5,6-10,9)	6,9	(4,8-9,7)	707
	25 - 34	7,9	(5,4-10,4)	6,9	(4,9-9,5)	1026
	35 - 44	5,5	(3,6-7,3)	4,6	(3,2-6,4)	1269
	45 - 54	1,1	(0,5-1,7)	0,9	(0,5-1,6)	1405
	55 - 64	0,5	(0,1-0,9)	0,4	(0,2-0,9)	1382
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	6,2	(1,8-10,6)	3,2	(1,3-7,6)	189
	Secondaire inférieur	4,2	(1,6-6,9)	2,7	(1,5-5,1)	527
	Secondaire supérieur	4,7	(3,0-6,3)	2,4	(1,7-3,6)	1762
	Enseignement supérieur	3,9	(3,0-4,8)	2,1	(1,5-2,8)	3210
REGION	Région flamande	3,6	(2,6-4,5)	2,0	(1,4-2,7)	2299
	Région bruxelloise	8,2	(6,4-10,1)	4,2	(3,1-5,8)	1379
	Région wallonne	4,5	(3,0-5,9)	2,5	(1,7-3,5)	2111
ANNEE	2001	2,7	(2,2-3,2)	1,2	(1,0-1,6)	7333
	2004	2,8	(2,2-3,4)	1,4	(1,1-1,7)	6632
	2008	3,1	(2,4-3,8)	1,6	(1,2-2,1)	5532
	2013	2,6	(2,0-3,1)	1,3	(1,0-1,7)	4922
	2018	4,3	(3,5-5,1)	2,3	(1,8-2,9)	5789

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 6. Distribution (%) de la population 15 à 64 ans ayant consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours selon leur fréquence de consommation*, Belgique

ID06_1		20 jours ou plus	10 à 19 jours	1 à 9 jours	N
SEXE	Homme	33,5	17,5	49,0	179
	Femme	17,5	7,5	75,0	72
GROUPE D'AGE	15 - 24	15,4	12,0	72,6	65
	25 - 34	32,7	13,8	53,5	86
	35 - 44	32,7	21,5	45,8	67
	45 - 54	62,0	15,6	22,4	22
	55 - 64	48,8	3,7	47,5	11
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	48,5	11,5	40,0	11
	Secondaire inférieur	50,5	38,1	11,3	21
	Secondaire supérieur	42,4	12,5	45,1	70
	Enseignement supérieur	16,0	14,3	69,7	142
REGION	Région flamande	29,5	16,9	53,7	78
	Région bruxelloise	24,2	14,2	61,5	99
	Région wallonne	33,7	13,3	52,9	74
ANNEE	2004	30,1	13,8	56,1	199
	2008	29,3	7,0	63,7	202
	2013	20,9	17,3	61,8	140
	2018	29,9	15,2	54,8	251

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

Tableau B 7. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé intensivement (20+ jours) du cannabis au cours des 30 derniers jours, Belgique

ID06_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	2,3	(1,5-3,0)	1,7	(1,3-2,4)	2769
	Femme	0,3	(0,1-0,5)	0,3	(0,1-0,5)	3020
GROUPE D'AGE	15 - 24	1,3	(0,5-2,0)	0,8	(0,4-1,7)	707
	25 - 34	2,6	(1,0-4,1)	1,8	(1,0-3,1)	1026
	35 - 44	1,8	(0,9-2,7)	1,2	(0,7-2,1)	1269
	45 - 54	0,7	(0,2-1,2)	0,5	(0,2-1,0)	1405
	55 - 64	0,2	(0,0-0,5)	0,2	(0,1-0,4)	1382
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	3,0	(0,0-6,5)	1,5	(0,4-5,5)	189
	Secondaire inférieur	2,1	(0,4-3,8)	1,2	(0,5-2,7)	527
	Secondaire supérieur	2,0	(1,0-2,9)	0,9	(0,6-1,6)	1762
	Enseignement supérieur	0,6	(0,3-0,9)	0,3	(0,2-0,6)	3210
REGION	Région flamande	1,1	(0,5-1,6)	0,5	(0,3-0,9)	2299
	Région bruxelloise	2,0	(1,2-2,8)	0,9	(0,5-1,7)	1379
	Région wallonne	1,5	(0,8-2,3)	0,8	(0,5-1,4)	2111
ANNEE	2004	0,8	(0,5-1,1)	0,4	(0,3-0,6)	6628
	2008	0,9	(0,6-1,2)	0,5	(0,3-0,7)	5529
	2013	0,5	(0,3-0,8)	0,3	(0,2-0,5)	4922
	2018	1,3	(0,9-1,7)	0,7	(0,5-1,0)	5789

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 8. Distribution (%) de la population de 15 à 64 ans selon le risque d'usage problématique du cannabis au cours des 12 derniers mois, Belgique

ID04_1		Pas/peu de risque	Risque modéré	Risque élevé	N
SEXE	Homme	94,5	2,0	3,4	2768
	Femme	99,2	0,5	0,3	3020
GROUPE D'AGE	15 - 24	95,7	1,5	2,8	707
	25 - 34	94,3	2,3	3,3	1026
	35 - 44	95,2	2,0	2,8	1269
	45 - 54	99,0	0,5	0,5	1404
	55 - 64	99,5	0,2	0,3	1382
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	92,9	0,5	6,6	189
	Secondaire inférieur	94,7	1,6	3,7	527
	Secondaire supérieur	96,7	1,4	1,9	1761
	Enseignement supérieur	97,7	1,0	1,3	3210
REGION	Région flamande	97,3	1,3	1,4	2299
	Région bruxelloise	94,2	2,0	3,9	1379
	Région wallonne	97,1	1,0	1,9	2110
ANNEE	2018	96,9	1,3	1,8	5788

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

Tableau B 9. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant présenté une consommation problématique de cannabis au cours des 12 derniers mois, Belgique

ID04_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	5,5	(4,3-6,6)	3,9	(3,1-5,0)	2768
	Femme	0,8	(0,5-1,1)	0,5	(0,3-0,8)	3020
GROUPE D'AGE	15 - 24	4,3	(2,6-5,9)	2,8	(1,8-4,2)	707
	25 - 34	5,7	(3,6-7,8)	3,9	(2,7-5,7)	1026
	35 - 44	4,8	(3,2-6,3)	3,2	(2,2-4,5)	1269
	45 - 54	1,0	(0,4-1,6)	0,7	(0,3-1,2)	1404
	55 - 64	0,5	(0,2-0,8)	0,3	(0,2-0,7)	1382
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	7,1	(2,4-11,9)	3,4	(1,5-7,5)	189
	Secondaire inférieur	5,3	(2,5-8,1)	2,9	(1,7-5,1)	527
	Secondaire supérieur	3,3	(2,2-4,5)	1,5	(1,0-2,2)	1761
	Enseignement supérieur	2,3	(1,6-3,0)	1,0	(0,7-1,4)	3210
REGION	Région flamande	2,7	(1,9-3,6)	1,3	(0,9-1,8)	2299
	Région bruxelloise	5,8	(4,3-7,4)	2,5	(1,7-3,7)	1379
	Région wallonne	2,9	(1,9-3,9)	1,4	(0,9-2,1)	2110
ANNEE	2018	3,1	(2,5-3,7)	.	.	5788

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 10. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a déjà consommé une drogue autre que le cannabis au cours de son existence, Belgique

ID07_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	12,5	(10,6-14,4)	10,9	(9,2-12,8)	2522
	Femme	5,5	(4,4-6,7)	4,6	(3,6-5,9)	2725
GROUPE D'AGE	15 - 24	5,6	(3,2-8,0)	5,0	(3,2-7,7)	664
	25 - 34	15,9	(12,5-19,3)	15,1	(12,2-18,6)	964
	35 - 44	13,7	(10,9-16,5)	12,8	(10,4-15,7)	1163
	45 - 54	5,0	(3,4-6,6)	4,6	(3,3-6,3)	1258
	55 - 64	4,2	(2,2-6,2)	3,8	(2,3-6,3)	1198
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	6,0	(0,6-11,4)	5,0	(2,0-12,0)	157
	Secondaire inférieur	8,5	(4,5-12,5)	6,9	(4,2-11,1)	442
	Secondaire supérieur	11,1	(8,5-13,6)	8,8	(6,7-11,3)	1538
	Enseignement supérieur	8,0	(6,7-9,4)	6,3	(5,1-7,7)	3024
REGION	Région flamande	9,7	(8,0-11,4)	7,8	(6,3-9,6)	2111
	Région bruxelloise	11,7	(9,5-13,8)	8,5	(6,7-10,6)	1274
	Région wallonne	6,8	(5,0-8,7)	5,5	(4,1-7,2)	1862
ANNEE	2008	3,9	(3,2-4,6)	2,9	(2,4-3,5)	5461
	2013	3,6	(2,8-4,3)	2,7	(2,1-3,3)	4845
	2018	9,0	(7,8-10,2)	7,0	(6,0-8,2)	5247

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 11. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le cannabis au cours des 12 derniers mois, Belgique

ID07_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	4,5	(3,3-5,7)	3,0	(2,2-4,0)	2522
	Femme	1,4	(0,9-1,9)	0,9	(0,6-1,4)	2725
GROUPE D'AGE	15 - 24	3,3	(1,4-5,2)	2,8	(1,5-4,9)	664
	25 - 34	5,8	(3,7-8,0)	5,1	(3,6-7,2)	964
	35 - 44	4,5	(2,7-6,3)	3,8	(2,5-5,8)	1163
	45 - 54	1,0	(0,4-1,7)	0,9	(0,5-1,6)	1258
	55 - 64	0,3	(0,0-0,6)	0,3	(0,1-0,8)	1198
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	2,9	(0,0-7,1)	1,6	(0,4-7,2)	157
	Secondaire inférieur	3,8	(0,7-6,8)	2,3	(1,0-5,2)	442
	Secondaire supérieur	2,8	(1,6-3,9)	1,5	(0,9-2,5)	1538
	Enseignement supérieur	2,9	(2,0-3,8)	1,6	(1,1-2,3)	3024
REGION	Région flamande	3,2	(2,2-4,2)	1,8	(1,3-2,6)	2111
	Région bruxelloise	4,7	(3,2-6,1)	2,3	(1,5-3,6)	1274
	Région wallonne	1,9	(1,0-2,9)	1,1	(0,6-1,9)	1862
ANNEE	2008	1,5	(1,1-2,0)	0,8	(0,6-1,2)	5481
	2013	0,8	(0,5-1,2)	0,5	(0,3-0,7)	4846
	2018	2,9	(2,3-3,6)	1,6	(1,2-2,2)	5247

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 12. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le cannabis au cours des 30 derniers jours, Belgique

ID07_3		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	2,0	(1,2-2,7)	1,3	(0,9-2,0)	2522
	Femme	0,6	(0,3-0,9)	0,4	(0,2-0,7)	2725
GROUPE D'AGE	15 - 24	1,4	(0,0-2,8)	1,1	(0,4-3,0)	664
	25 - 34	2,6	(1,2-4,0)	2,2	(1,4-3,7)	964
	35 - 44	1,4	(0,4-2,4)	1,2	(0,6-2,4)	1163
	45 - 54	0,9	(0,3-1,4)	0,7	(0,4-1,5)	1258
	55 - 64	0,1	(0,0-0,2)	0,1	(0,0-0,4)	1198
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	0,8	(0,0-2,1)	0,5	(0,1-2,6)	157
	Secondaire inférieur	1,0	(0,0-2,0)	0,6	(0,2-2,0)	442
	Secondaire supérieur	1,5	(0,6-2,4)	0,8	(0,4-1,5)	1538
	Enseignement supérieur	1,2	(0,6-1,8)	0,7	(0,4-1,2)	3024
REGION	Région flamande	1,6	(0,8-2,3)	0,9	(0,5-1,5)	2111
	Région bruxelloise	2,1	(1,0-3,2)	1,1	(0,6-2,1)	1274
	Région wallonne	0,5	(0,1-0,8)	0,3	(0,1-0,7)	1862
ANNEE	2018	1,3	(0,8-1,7)	.	.	5247

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 13. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé de la cocaïne au cours des 12 derniers mois, Belgique

ID7_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	2,6	(1,6-3,6)	0,9	(0,5-1,5)	2522
	Femme	0,4	(0,2-0,7)	0,1	(0,1-0,3)	2725
GROUPE D'AGE	15 - 24	1,8	(0,3-3,3)	1,2	(0,5-2,9)	664
	25 - 34	3,7	(1,9-5,5)	2,7	(1,7-4,3)	964
	35 - 44	2,0	(0,8-3,1)	1,4	(0,8-2,4)	1163
	45 - 54	0,2	(0,0-0,4)	0,2	(0,1-0,4)	1258
	55 - 64	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,1)	1198
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	0,1	(0,0-0,4)	0,0	(0,0-0,3)	157
	Secondaire inférieur	0,8	(0,0-1,8)	0,2	(0,0-0,8)	442
	Secondaire supérieur	1,4	(0,5-2,4)	0,3	(0,1-0,7)	1538
	Enseignement supérieur	1,7	(1,0-2,5)	0,4	(0,2-0,7)	3024
REGION	Région flamande	1,7	(0,9-2,5)	0,4	(0,2-0,7)	2111
	Région bruxelloise	3,0	(1,8-4,1)	0,6	(0,3-1,3)	1274
	Région wallonne	0,7	(0,1-1,4)	0,2	(0,1-0,5)	1862
ANNEE	2008	0,9	(0,6-1,2)	0,4	(0,2-0,6)	5484
	2013	0,5	(0,3-0,7)	0,2	(0,1-0,4)	4846
	2018	1,5	(1,0-2,0)	0,6	(0,4-0,9)	5247

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 14. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé de l'ecstasy au cours des 12 derniers mois, Belgique

ID7_3		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	1,9	(1,1-2,6)	0,1	(0,0-0,1)	2522
	Femme	0,5	(0,3-0,8)	0,0	(0,0-0,0)	2725
GROUPE D'AGE	15 - 24	1,8	(0,3-3,3)	1,4	(0,6-3,3)	664
	25 - 34	3,0	(1,6-4,5)	2,6	(1,7-4,1)	964
	35 - 44	1,3	(0,5-2,2)	1,1	(0,6-2,2)	1163
	45 - 54	0,1	(0,0-0,2)	0,1	(0,0-0,4)	1258
	55 - 64	0,0	.	0,0	.	1198
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	0,0	.	0,0	.	157
	Secondaire inférieur	1,4	(0,0-3,3)	0,0	.	442
	Secondaire supérieur	0,9	(0,2-1,5)	0,0	.	1538
	Enseignement supérieur	1,4	(0,8-2,0)	0,0	.	3024
REGION	Région flamande	1,3	(0,6-2,0)	0,0	(0,0-0,1)	2111
	Région bruxelloise	2,5	(1,4-3,6)	0,1	(0,0-0,1)	1274
	Région wallonne	0,6	(0,0-1,2)	0,0	.	1862
ANNEE	2008	0,6	(0,4-0,9)	0,2	(0,1-0,4)	5483
	2013	0,3	(0,2-0,5)	0,1	(0,1-0,3)	4845
	2018	1,2	(0,8-1,6)	0,4	(0,2-0,7)	5247

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 15. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé différents types de drogues au cours des 12 derniers mois, Belgique

ID_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	4,0	(2,8-5,2)	1,4	(0,9-2,4)	2308
	Femme	0,8	(0,5-1,2)	0,3	(0,1-0,5)	2599
GROUPE D'AGE	15 - 24	3,4	(1,3-5,5)	2,5	(1,3-4,8)	568
	25 - 34	5,3	(3,2-7,4)	4,3	(2,9-6,3)	863
	35 - 44	3,5	(1,9-5,1)	2,7	(1,7-4,2)	1082
	45 - 54	0,4	(0,0-0,9)	0,3	(0,1-0,9)	1215
	55 - 64	0,0	.	0,0	.	1179
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	3,0	(0,0-7,6)	0,7	(0,1-3,6)	148
	Secondaire inférieur	3,2	(0,2-6,3)	1,0	(0,3-2,7)	416
	Secondaire supérieur	1,9	(0,9-2,9)	0,5	(0,2-1,0)	1443
	Enseignement supérieur	2,4	(1,6-3,2)	0,6	(0,4-1,1)	2820
REGION	Région flamande	2,4	(1,5-3,3)	0,7	(0,4-1,1)	1991
	Région bruxelloise	4,8	(3,2-6,3)	1,1	(0,6-2,1)	1164
	Région wallonne	1,6	(0,6-2,5)	0,4	(0,2-0,9)	1752
ANNEE	2008	1,2	(0,8-1,6)	0,4	(0,3-0,7)	5556
	2013	0,5	(0,3-0,8)	0,2	(0,1-0,3)	4968
	2018	2,4	(1,7-3,0)	0,9	(0,6-1,4)	4907

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 16. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a déjà consommé du cannabis au cours de son existence, Région flamande

ID01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	27,1	(23,8-30,3)	25,2	(22,0-28,7)	1107
	Femme	16,5	(14,0-19,0)	14,3	(12,0-17,0)	1196
GROUPE D'AGE	15 - 24	20,8	(15,5-26,2)	20,1	(15,4-25,8)	283
	25 - 34	39,6	(33,5-45,7)	39,6	(33,5-46,1)	391
	35 - 44	31,5	(26,7-36,3)	30,9	(26,3-35,9)	478
	45 - 54	12,3	(8,9-15,8)	11,8	(8,9-15,6)	568
	55 - 64	7,8	(5,0-10,7)	7,5	(5,1-10,8)	583
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	9,9	(0,0-20,6)	10,5	(3,3-29,1)	42
	Secondaire inférieur	16,5	(9,5-23,6)	17,1	(11,1-25,4)	178
	Secondaire supérieur	19,2	(15,2-23,2)	16,7	(13,2-20,9)	776
	Enseignement supérieur	24,2	(21,2-27,2)	20,9	(18,0-24,1)	1289
ANNEE	2001	10,6	(9,0-12,2)	7,4	(6,2-8,7)	2643
	2004	12,2	(10,4-14,0)	8,9	(7,5-10,6)	2522
	2008	13,4	(11,5-15,3)	10,4	(8,9-12,2)	2129
	2013	14,1	(11,9-16,4)	11,3	(9,5-13,3)	1864
	2018	21,8	(19,5-24,0)	18,7	(16,5-21,1)	2303

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 17. Age moyen à la première consommation de cannabis dans la population de 15 à 64 ans, Région flamande

ID02_1		Moyenne brut	CI 95% brut	Moyenne stand*	CI 95% stand	N
SEXE	Homme	18,8	(18,2-19,3)	19,7	(18,8-20,5)	281
	Femme	20,0	(18,7-21,3)	21,0	(19,6-22,4)	199
GROUPE D'AGE	15 - 24	17,0	(16,5-17,5)	17,2	(16,7-17,7)	63
	25 - 34	18,1	(17,5-18,7)	18,2	(17,6-18,7)	149
	35 - 44	18,5	(17,8-19,2)	18,7	(18,0-19,4)	153
	45 - 54	24,7	(21,5-28,0)	25,0	(21,7-28,2)	70
	55 - 64	21,8	(19,1-24,5)	21,9	(19,3-24,4)	45
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	16,7	(2,5-31,0)	17,2	(14,3-20,2)	4
	Secondaire inférieur	18,4	(16,2-20,7)	20,1	(17,9-22,2)	23
	Secondaire supérieur	18,8	(17,9-19,8)	20,0	(18,8-21,2)	134
	Enseignement supérieur	19,4	(18,6-20,2)	20,5	(19,4-21,6)	312
ANNEE	2004	19,7	(18,9-20,5)	21,9	(20,9-22,9)	286
	2008	19,0	(18,2-19,8)	20,9	(20,0-21,8)	283
	2013	18,3	(17,6-18,9)	20,3	(19,5-21,1)	255
	2018	19,2	(18,6-19,9)	20,3	(19,5-21,1)	480

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 18. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, Région flamande

ID03_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	9,0	(6,9-11,0)	6,1	(4,7-8,0)	1105
	Femme	3,5	(2,3-4,7)	2,3	(1,5-3,4)	1195
GROUPE D'AGE	15 - 24	13,6	(9,0-18,2)	12,3	(8,5-17,5)	283
	25 - 34	11,0	(7,0-15,1)	10,2	(7,0-14,7)	390
	35 - 44	7,8	(5,1-10,5)	7,0	(4,9-9,8)	478
	45 - 54	1,8	(0,6-3,1)	1,6	(0,8-3,3)	566
	55 - 64	0,6	(0,1-1,2)	0,6	(0,2-1,4)	583
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	3,2	(0,0-7,9)	1,9	(0,3-10,7)	42
	Secondaire inférieur	5,0	(0,7-9,2)	3,9	(1,6-9,5)	178
	Secondaire supérieur	5,8	(3,6-8,1)	3,4	(2,2-5,3)	775
	Enseignement supérieur	6,5	(4,9-8,2)	3,7	(2,5-5,3)	1287
ANNEE	2004	4,6	(3,5-5,7)	2,4	(1,8-3,1)	2516
	2008	4,6	(3,5-5,8)	2,5	(1,8-3,3)	2123
	2013	3,5	(2,1-4,8)	1,9	(1,2-2,9)	1862
	2018	6,2	(5,0-7,5)	3,6	(2,8-4,6)	2300

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 19. Pourcentage des consommateurs de cannabis de 15 à 64 ans qui n'en ont pas consommé au cours des 12 derniers mois, Région flamande

ID03_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	66,7	(60,2-73,2)	72,0	(64,5-78,4)	285
	Femme	78,7	(72,0-85,4)	83,2	(75,1-89,1)	200
GROUPE D'AGE	15 - 24	34,8	(20,1-49,5)	36,9	(23,4-52,9)	63
	25 - 34	72,1	(62,8-81,3)	73,3	(63,7-81,1)	151
	35 - 44	75,4	(67,2-83,5)	77,8	(69,4-84,4)	155
	45 - 54	85,0	(74,9-95,1)	86,7	(73,6-93,8)	71
	55 - 64	92,0	(84,5-99,4)	92,6	(81,8-97,2)	45
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	67,7	(0,0-100,0)	81,4	(1,6-99,9)	4
	Secondaire inférieur	70,0	(47,4-92,5)	80,3	(53,3-93,6)	24
	Secondaire supérieur	69,5	(59,1-79,9)	76,8	(66,3-84,8)	136
	Enseignement supérieur	72,8	(66,7-78,9)	79,7	(71,7-85,9)	314
ANNEE	2004	61,4	(54,1-68,8)	73,3	(65,5-79,9)	291
	2008	64,5	(57,4-71,7)	75,5	(67,9-81,8)	287
	2013	75,2	(67,0-83,3)	84,8	(77,7-90,0)	258
	2018	71,3	(66,2-76,3)	76,8	(71,4-81,4)	485

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 20. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours, Région flamande

ID05_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	5,6	(4,0-7,3)	3,9	(2,8-5,5)	1104
	Femme	1,5	(0,7-2,3)	1,0	(0,6-1,8)	1195
GROUPE D'AGE	15 - 24	4,7	(2,2-7,3)	3,8	(2,1-6,8)	282
	25 - 34	7,8	(4,1-11,5)	6,7	(4,0-11,0)	390
	35 - 44	5,0	(2,7-7,3)	4,1	(2,5-6,5)	478
	45 - 54	0,9	(0,1-1,6)	0,7	(0,3-1,7)	566
	55 - 64	0,6	(0,1-1,2)	0,5	(0,2-1,3)	583
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	3,2	(0,0-7,9)	2,2	(0,4-11,5)	42
	Secondaire inférieur	3,4	(0,0-7,4)	2,2	(0,7-7,2)	178
	Secondaire supérieur	3,8	(1,8-5,9)	2,0	(1,1-3,6)	774
	Enseignement supérieur	3,2	(2,2-4,3)	1,6	(1,0-2,6)	1287
ANNEE	2001	2,3	(1,6-3,0)	1,0	(0,7-1,5)	2641
	2004	2,4	(1,7-3,2)	1,1	(0,8-1,6)	2515
	2008	2,8	(1,8-3,7)	1,4	(0,9-2,1)	2122
	2013	1,7	(1,0-2,4)	0,9	(0,5-1,4)	1862
	2018	3,6	(2,6-4,5)	1,9	(1,3-2,6)	2299

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 21. Distribution (%) de la population 15 à 64 ans ayant consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours selon leur fréquence de consommation*, Région flamande

ID06_1		20 jours ou plus	10 à 19 jours	1 à 9 jours	N
SEXE	Homme	34,6	20,6	44,9	58
	Femme	10,4	3,2	86,4	20
GROUPE D'AGE	15 - 24	12,4	17,8	69,8	15
	25 - 34	28,2	13,2	58,6	28
	35 - 44	30,3	27,4	42,3	24
	45 - 54	79,3	0,0	20,7	6
	55 - 64	48,0	0,0	52,0	5
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	40,7	0,0	59,3	2
	Secondaire inférieur	27,7	54,1	18,3	4
	Secondaire supérieur	44,6	11,9	43,5	23
	Enseignement supérieur	17,3	17,4	65,3	46
ANNEE	2004	28,6	8,6	62,8	62
	2008	27,7	8,7	63,6	61
	2013	22,9	25,7	51,3	36
	2018	29,5	16,9	53,7	78

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

Tableau B 22. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé intensivement (20+ jours) du cannabis au cours des 30 derniers jours, Région flamande

ID06_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	1,9	(0,9-3,0)	1,6	(1,0-2,5)	1104
	Femme	0,2	(0,0-0,3)	0,1	(0,0-0,4)	1195
GROUPE D'AGE	15 - 24	0,6	(0,0-1,4)	0,3	(0,1-1,3)	282
	25 - 34	2,2	(0,0-4,4)	1,2	(0,5-3,1)	390
	35 - 44	1,5	(0,4-2,7)	0,8	(0,3-1,8)	478
	45 - 54	0,7	(0,0-1,4)	0,4	(0,1-1,3)	566
	55 - 64	0,3	(0,0-0,6)	0,2	(0,0-0,6)	583
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	1,3	(0,0-4,0)	0,7	(0,0-8,8)	42
	Secondaire inférieur	0,9	(0,0-2,3)	0,3	(0,1-1,8)	178
	Secondaire supérieur	1,7	(0,4-3,1)	0,6	(0,2-1,4)	774
	Enseignement supérieur	0,6	(0,1-1,0)	0,2	(0,1-0,5)	1287
ANNEE	2004	0,7	(0,3-1,1)	0,3	(0,2-0,6)	2513
	2008	0,8	(0,3-1,2)	0,4	(0,2-0,8)	2121
	2013	0,4	(0,1-0,7)	0,2	(0,1-0,5)	1862
	2018	1,1	(0,5-1,6)	0,6	(0,3-1,0)	2299

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 23. Distribution (%) de la population de 15 à 64 ans selon le risque d'usage problématique du cannabis au cours des 12 derniers mois, Région flamande

ID04_1		Pas/peu de risque	Risque modéré	Risque élevé	N
SEXE	Homme	95,1	2,1	2,8	1104
	Femme	99,4	0,5	0,1	1195
GROUPE D'AGE	15 - 24	97,1	1,0	1,9	282
	25 - 34	94,8	3,0	2,3	390
	35 - 44	95,0	2,3	2,7	478
	45 - 54	99,3	0,3	0,4	566
	55 - 64	99,4	0,2	0,4	583
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	96,8	0,0	3,2	42
	Secondaire inférieur	95,6	1,4	3,1	178
	Secondaire supérieur	97,2	1,5	1,3	774
	Enseignement supérieur	97,7	1,0	1,2	1287
ANNEE	2018	97,3	1,3	1,4	2299

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

Tableau B 24. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant présenté une consommation problématique de cannabis au cours des 12 derniers mois, Région flamande

ID04_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	4,9	(3,3-6,5)	3,5	(2,4-4,9)	1104
	Femme	0,6	(0,2-1,0)	0,4	(0,2-0,9)	1195
GROUPE D'AGE	15 - 24	2,9	(0,9-4,9)	1,8	(0,8-3,8)	282
	25 - 34	5,2	(2,3-8,1)	3,5	(2,0-6,2)	390
	35 - 44	5,0	(2,7-7,2)	3,2	(1,9-5,2)	478
	45 - 54	0,7	(0,0-1,4)	0,4	(0,1-1,3)	566
	55 - 64	0,6	(0,1-1,1)	0,4	(0,1-0,9)	583
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	3,2	(0,0-7,9)	1,7	(0,3-10,2)	42
	Secondaire inférieur	4,4	(0,2-8,6)	2,2	(0,8-6,0)	178
	Secondaire supérieur	2,8	(1,3-4,3)	1,1	(0,6-2,1)	774
	Enseignement supérieur	2,3	(1,3-3,2)	0,8	(0,4-1,5)	1287
ANNEE	2018	2,7	(1,9-3,6)	.	.	2299

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 25. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a déjà consommé une drogue autre que le cannabis au cours de son existence, Région flamande

ID07_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	13,6	(11,0-16,3)	11,8	(9,5-14,6)	1017
	Femme	5,8	(4,1-7,4)	4,7	(3,3-6,6)	1094
GROUPE D'AGE	15 - 24	6,8	(2,9-10,7)	6,0	(3,3-10,6)	264
	25 - 34	17,9	(13,1-22,8)	17,1	(12,9-22,3)	374
	35 - 44	15,0	(11,0-19,0)	13,8	(10,5-18,0)	442
	45 - 54	4,5	(2,7-6,3)	4,0	(2,7-6,0)	526
	55 - 64	4,5	(1,4-7,5)	4,0	(1,9-8,2)	505
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	6,3	(0,0-15,8)	5,8	(1,2-24,5)	30
	Secondaire inférieur	12,2	(4,9-19,5)	10,3	(5,5-18,3)	144
	Secondaire supérieur	12,0	(8,6-15,5)	9,6	(6,7-13,5)	694
	Enseignement supérieur	8,3	(6,3-10,2)	6,2	(4,7-8,2)	1229
ANNEE	2008	3,7	(2,8-4,7)	2,7	(2,0-3,6)	2096
	2013	3,8	(2,7-4,8)	2,7	(1,9-3,7)	1823
	2018	9,7	(8,0-11,4)	7,3	(5,9-9,1)	2111

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 26. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le cannabis au cours des 12 derniers mois, Région flamande

ID07_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	5,1	(3,3-6,9)	3,5	(2,5-5,0)	1017
	Femme	1,3	(0,7-1,9)	0,9	(0,5-1,6)	1094
GROUPE D'AGE	15 - 24	3,9	(0,9-6,8)	3,0	(1,3-6,5)	264
	25 - 34	6,3	(3,1-9,4)	5,3	(3,3-8,3)	374
	35 - 44	5,0	(2,4-7,7)	4,1	(2,4-6,9)	442
	45 - 54	1,0	(0,3-1,7)	0,8	(0,4-1,7)	526
	55 - 64	0,5	(0,0-1,0)	0,4	(0,1-1,2)	505
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	0,0	.	0,0	.	30
	Secondaire inférieur	4,6	(0,0-9,9)	2,9	(0,9-9,1)	144
	Secondaire supérieur	3,1	(1,5-4,8)	1,8	(0,9-3,3)	694
	Enseignement supérieur	3,1	(1,8-4,3)	1,6	(1,0-2,7)	1229
ANNEE	2008	1,6	(0,9-2,2)	0,8	(0,5-1,2)	2102
	2013	0,8	(0,3-1,3)	0,4	(0,2-0,8)	1822
	2018	3,2	(2,2-4,2)	1,6	(1,1-2,3)	2111

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 27. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le cannabis au cours des 30 derniers jours, Région flamande

ID07_3		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	2,4	(1,1-3,6)	1,5	(0,9-2,7)	1017
	Femme	0,7	(0,3-1,2)	0,5	(0,2-1,0)	1094
GROUPE D'AGE	15 - 24	1,6	(0,0-3,9)	1,3	(0,3-5,2)	264
	25 - 34	3,4	(1,2-5,6)	2,9	(1,6-5,3)	374
	35 - 44	1,9	(0,2-3,6)	1,6	(0,7-3,9)	442
	45 - 54	0,9	(0,2-1,5)	0,7	(0,3-1,7)	526
	55 - 64	0,1	(0,0-0,3)	0,1	(0,0-0,7)	505
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	0,0	.	0,0	.	30
	Secondaire inférieur	1,2	(0,0-2,9)	0,7	(0,1-3,9)	144
	Secondaire supérieur	1,8	(0,4-3,2)	1,0	(0,5-2,2)	694
	Enseignement supérieur	1,5	(0,6-2,4)	0,8	(0,4-1,7)	1229
ANNEE	2018	1,6	(0,8-2,3)	.	.	2111

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 28. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé de la cocaïne au cours des 12 derniers mois, Région flamande

ID7_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	3,0	(1,5-4,5)	0,1	(0,1-0,2)	1017
	Femme	0,4	(0,1-0,7)	0,0	(0,0-0,0)	1094
GROUPE D'AGE	15 - 24	1,9	(0,0-4,2)	1,1	(0,3-4,3)	264
	25 - 34	4,5	(1,7-7,3)	2,9	(1,5-5,4)	374
	35 - 44	2,3	(0,5-4,0)	1,4	(0,6-3,0)	442
	45 - 54	0,1	(0,0-0,3)	0,1	(0,0-0,5)	526
	55 - 64	0,0	.	0,0	.	505
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	0,0	.	0,0	.	30
	Secondaire inférieur	0,8	(0,0-2,4)	0,0	.	144
	Secondaire supérieur	1,7	(0,3-3,1)	0,0	.	694
	Enseignement supérieur	1,8	(0,7-2,9)	0,0	.	1229
ANNEE	2008	0,8	(0,3-1,2)	0,2	(0,1-0,5)	2104
	2013	0,4	(0,2-0,7)	0,1	(0,1-0,3)	1822
	2018	1,7	(0,9-2,5)	0,5	(0,3-1,0)	2111

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 29. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé de l'ecstasy au cours des 12 derniers mois, Région flamande

ID7_3		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	2,1	(0,9-3,2)	0,1	(0,0-0,1)	1017
	Femme	0,6	(0,2-1,0)	0,0	.	1094
GROUPE D'AGE	15 - 24	1,6	(0,0-3,9)	1,3	(0,3-5,2)	264
	25 - 34	3,2	(1,1-5,3)	2,7	(1,5-4,9)	374
	35 - 44	1,9	(0,5-3,3)	1,5	(0,6-3,6)	442
	45 - 54	0,1	(0,0-0,3)	0,1	(0,0-0,6)	526
	55 - 64	0,0	.	0,0	.	505
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	0,0	.	0,0	.	30
	Secondaire inférieur	0,0	.	0,0	.	144
	Secondaire supérieur	1,2	(0,1-2,2)	0,0	.	694
	Enseignement supérieur	1,6	(0,6-2,5)	0,0	.	1229
ANNEE	2008	0,7	(0,2-1,1)	0,0	.	2104
	2013	0,2	(0,0-0,4)	0,0	.	1821
	2018	1,3	(0,6-2,0)	0,0	.	2111

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 30. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé différents types de drogues au cours des 12 derniers mois, Région flamande

ID_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	4,2	(2,6-5,9)	0,1	(0,1-0,2)	944
	Femme	0,7	(0,2-1,1)	0,0	.	1047
GROUPE D'AGE	15 - 24	3,6	(0,4-6,7)	2,3	(0,9-5,9)	229
	25 - 34	5,3	(2,3-8,3)	3,9	(2,3-6,7)	340
	35 - 44	4,2	(1,9-6,6)	3,0	(1,6-5,5)	418
	45 - 54	0,1	(0,0-0,3)	0,1	(0,0-0,5)	507
	55 - 64	0,0	.	0,0	.	497
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	0,0	.	0,0	.	28
	Secondaire inférieur	3,3	(0,0-8,3)	0,1	(0,0-0,4)	137
	Secondaire supérieur	2,0	(0,6-3,4)	0,0	.	658
	Enseignement supérieur	2,5	(1,3-3,7)	0,0	.	1156
ANNEE	2008	1,2	(0,6-1,8)	0,0	.	2128
	2013	0,5	(0,2-0,7)	0,0	.	1875
	2018	2,4	(1,5-3,3)	0,1	(0,0-0,1)	1991

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 31. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a déjà consommé du cannabis au cours de son existence, Région bruxelloise

ID01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	36,0	(31,8-40,3)	33,6	(29,5-38,0)	651
	Femme	24,5	(20,9-28,0)	22,5	(19,2-26,3)	729
GROUPE D'AGE	15 - 24	37,8	(27,6-48,1)	37,3	(27,9-47,7)	124
	25 - 34	37,6	(31,5-43,6)	37,4	(31,5-43,7)	305
	35 - 44	35,9	(30,0-41,7)	35,6	(30,1-41,6)	366
	45 - 54	19,6	(14,9-24,4)	19,3	(15,0-24,5)	301
	55 - 64	16,4	(11,4-21,3)	16,3	(11,9-21,9)	284
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	12,6	(1,0-24,1)	10,0	(3,9-23,4)	72
	Secondaire inférieur	20,0	(9,9-30,2)	20,2	(11,7-32,5)	88
	Secondaire supérieur	20,2	(14,8-25,6)	16,6	(12,3-22,0)	312
	Enseignement supérieur	36,7	(32,8-40,6)	35,2	(31,3-39,3)	873
ANNEE	2001	17,8	(15,5-20,1)	14,7	(12,8-16,8)	1706
	2004	21,9	(19,2-24,5)	18,6	(16,3-21,2)	1506
	2008	23,4	(20,7-26,1)	19,9	(17,5-22,6)	1485
	2013	22,0	(18,7-25,3)	19,0	(16,1-22,2)	1088
	2018	30,2	(27,2-33,2)	27,0	(24,2-30,1)	1380

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 32. Age moyen à la première consommation de cannabis dans la population de 15 à 64 ans, Région bruxelloise

ID02_1		Moyenne brut	CI 95% brut	Moyenne stand*	CI 95% stand	N
SEXE	Homme	18,6	(18,1-19,2)	19,6	(18,9-20,3)	221
	Femme	19,6	(18,7-20,5)	20,3	(19,3-21,4)	174
GROUPE D'AGE	15 - 24	16,8	(16,1-17,6)	17,0	(16,2-17,7)	44
	25 - 34	18,2	(17,4-18,9)	18,2	(17,4-19,0)	115
	35 - 44	18,8	(18,2-19,4)	18,9	(18,3-19,5)	125
	45 - 54	21,2	(19,5-23,0)	21,3	(19,6-23,0)	64
	55 - 64	24,0	(21,1-26,9)	24,0	(21,2-26,8)	47
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	19,1	(14,3-23,9)	19,9	(16,1-23,7)	7
	Secondaire inférieur	17,6	(15,3-20,0)	17,7	(15,2-20,3)	18
	Secondaire supérieur	19,3	(17,9-20,7)	20,6	(19,2-22,0)	56
	Enseignement supérieur	19,1	(18,5-19,6)	20,0	(19,2-20,8)	302
ANNEE	2004	19,3	(18,6-19,9)	20,7	(20,0-21,3)	310
	2008	19,2	(18,6-19,8)	20,4	(19,7-21,0)	325
	2013	18,3	(17,7-19,0)	19,5	(18,8-20,1)	210
	2018	19,0	(18,5-19,5)	19,9	(19,3-20,5)	395

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 33. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise

ID03_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	18,1	(14,4-21,8)	14,3	(11,2-18,0)	651
	Femme	6,8	(4,7-9,0)	5,2	(3,7-7,2)	728
GROUPE D'AGE	15 - 24	20,5	(11,6-29,4)	18,6	(12,0-27,8)	124
	25 - 34	17,9	(13,0-22,8)	16,5	(12,1-22,3)	305
	35 - 44	13,5	(8,7-18,3)	12,2	(8,4-17,6)	365
	45 - 54	6,4	(3,2-9,6)	5,7	(3,5-9,2)	301
	55 - 64	2,5	(0,7-4,4)	2,3	(1,1-4,8)	284
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	10,9	(0,0-21,9)	6,4	(2,2-17,3)	72
	Secondaire inférieur	9,7	(3,2-16,3)	8,2	(4,1-15,7)	88
	Secondaire supérieur	9,3	(5,5-13,0)	5,5	(3,4-8,9)	312
	Enseignement supérieur	14,0	(10,9-17,1)	10,4	(8,1-13,4)	872
ANNEE	2004	9,2	(7,3-11,1)	5,7	(4,4-7,3)	1499
	2008	8,6	(6,9-10,4)	5,3	(4,1-6,7)	1480
	2013	8,1	(5,9-10,3)	5,1	(3,8-6,9)	1087
	2018	12,4	(10,1-14,7)	8,1	(6,5-10,1)	1379

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 34. Pourcentage des consommateurs de cannabis de 15 à 64 ans qui n'en ont pas consommé au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise

ID03_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	49,7	(42,0-57,5)	55,5	(47,0-63,6)	221
	Femme	72,0	(64,3-79,7)	76,5	(68,5-83,0)	174
GROUPE D'AGE	15 - 24	45,8	(27,3-64,2)	49,8	(33,4-66,3)	44
	25 - 34	52,3	(42,0-62,7)	53,7	(42,7-64,3)	115
	35 - 44	62,2	(50,9-73,4)	65,6	(53,7-75,9)	125
	45 - 54	67,4	(53,9-80,8)	70,1	(57,0-80,6)	64
	55 - 64	84,5	(73,3-95,7)	85,5	(72,1-93,1)	47
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	13,1	(0,0-39,5)	15,8	(4,0-45,7)	7
	Secondaire inférieur	51,4	(24,7-78,1)	55,2	(30,8-77,3)	18
	Secondaire supérieur	54,2	(38,4-70,0)	67,2	(50,2-80,6)	56
	Enseignement supérieur	61,7	(54,8-68,7)	69,8	(62,1-76,4)	302
ANNEE	2004	57,2	(50,5-63,9)	68,3	(61,2-74,6)	312
	2008	62,5	(56,4-68,7)	71,6	(65,1-77,4)	328
	2013	62,8	(54,6-71,1)	73,1	(64,8-80,0)	213
	2018	58,8	(52,8-64,9)	67,4	(60,9-73,3)	395

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 35. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours, Région bruxelloise

ID05_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	12,7	(9,5-15,9)	9,7	(7,3-12,8)	651
	Femme	3,9	(2,3-5,5)	2,9	(1,9-4,5)	728
GROUPE D'AGE	15 - 24	16,9	(8,9-24,9)	14,7	(9,0-23,1)	124
	25 - 34	10,9	(6,9-15,0)	9,5	(6,2-14,4)	305
	35 - 44	8,5	(5,2-11,9)	7,3	(4,9-10,8)	365
	45 - 54	3,9	(1,4-6,3)	3,3	(1,7-6,1)	301
	55 - 64	1,6	(0,3-3,0)	1,4	(0,6-3,3)	284
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	5,5	(0,0-11,5)	2,7	(0,7-9,7)	72
	Secondaire inférieur	7,0	(1,5-12,5)	5,5	(2,5-11,6)	88
	Secondaire supérieur	5,4	(2,6-8,3)	2,9	(1,6-5,4)	312
	Enseignement supérieur	9,6	(7,0-12,2)	6,8	(4,9-9,2)	872
ANNEE	2001	5,2	(3,8-6,5)	2,7	(2,0-3,7)	1706
	2004	4,8	(3,5-6,0)	2,6	(1,9-3,5)	1496
	2008	6,3	(4,8-7,9)	3,5	(2,6-4,7)	1479
	2013	5,2	(3,4-7,0)	2,9	(2,0-4,3)	1086
	2018	8,2	(6,4-10,1)	4,8	(3,6-6,3)	1379

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 36. Distribution (%) de la population 15 à 64 ans ayant consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours selon leur fréquence de consommation, Région bruxelloise

ID06_1		20 jours ou plus	10 à 19 jours	1 à 9 jours	N
SEXE	Homme	28,5	16,1	55,4	73
	Femme	10,5	8,2	81,3	26
GROUPE D'AGE	15 - 24	13,4	8,5	78,1	21
	25 - 34	13,7	17,8	68,4	33
	35 - 44	36,0	20,7	43,3	28
	45 - 54	55,3	0,0	44,7	11
	55 - 64	51,2	15,5	33,3	6
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	79,9	0,0	20,1	4
	Secondaire inférieur	66,9	0,0	33,1	6
	Secondaire supérieur	47,0	24,7	28,3	16
	Enseignement supérieur	14,3	14,4	71,4	69
ANNEE	2004	34,9	14,6	50,5	70
	2008	35,4	2,9	61,7	86
	2013	23,2	6,5	70,3	44
	2018	24,2	14,2	61,5	99

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

Tableau B 37. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé intensivement (20+ jours) du cannabis au cours des 30 derniers jours, Région bruxelloise

ID06_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	3,6	(2,1-5,1)	3,3	(2,1-5,0)	651
	Femme	0,4	(0,0-0,9)	0,4	(0,1-1,3)	728
GROUPE D'AGE	15 - 24	2,3	(0,0-4,5)	1,3	(0,3-5,1)	124
	25 - 34	1,5	(0,1-2,9)	0,9	(0,3-2,4)	305
	35 - 44	3,1	(1,2-5,0)	1,9	(0,9-3,8)	365
	45 - 54	2,1	(0,1-4,1)	1,3	(0,5-3,5)	301
	55 - 64	0,8	(0,0-1,8)	0,5	(0,1-2,1)	284
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	4,4	(0,0-10,0)	2,1	(0,5-8,1)	72
	Secondaire inférieur	4,7	(0,0-9,4)	3,5	(1,2-9,8)	88
	Secondaire supérieur	2,6	(0,7-4,4)	1,2	(0,5-2,9)	312
	Enseignement supérieur	1,4	(0,6-2,2)	0,7	(0,3-1,9)	872
ANNEE	2004	1,6	(1,0-2,3)	1,1	(0,6-1,7)	1495
	2008	2,2	(1,3-3,1)	1,4	(0,8-2,3)	1477
	2013	1,2	(0,5-1,9)	0,8	(0,4-1,4)	1086
	2018	2,0	(1,2-2,8)	1,3	(0,8-2,0)	1379

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 38. Distribution (%) de la population de 15 à 64 ans selon le risque d'usage problématique du cannabis au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise

ID04_1		Pas/peu de risque	Risque modéré	Risque élevé	N
SEXE	Homme	89,8	2,9	7,2	651
	Femme	98,4	1,0	0,6	728
GROUPE D'AGE	15 - 24	92,2	0,5	7,3	124
	25 - 34	93,7	2,0	4,3	305
	35 - 44	91,1	4,2	4,7	365
	45 - 54	96,1	1,1	2,7	301
	55 - 64	98,6	0,8	0,5	284
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	89,1	0,0	10,9	72
	Secondaire inférieur	93,3	2,0	4,7	88
	Secondaire supérieur	94,3	2,1	3,6	312
	Enseignement supérieur	94,6	2,2	3,2	872
ANNEE	2018	94,2	2,0	3,9	1379

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

Tableau B 39. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant présenté une consommation problématique de cannabis au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise

ID04_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	10,2	(7,3-13,0)	8,2	(6,0-11,2)	651
	Femme	1,6	(0,5-2,7)	1,3	(0,7-2,5)	728
GROUPE D'AGE	15 - 24	7,8	(1,7-13,9)	5,4	(2,4-11,6)	124
	25 - 34	6,3	(3,2-9,4)	4,5	(2,4-8,2)	305
	35 - 44	8,9	(5,2-12,5)	6,4	(3,9-10,3)	365
	45 - 54	3,9	(1,4-6,3)	2,7	(1,4-5,1)	301
	55 - 64	1,4	(0,1-2,6)	1,0	(0,4-2,6)	284
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	10,9	(0,0-21,9)	5,7	(2,0-15,6)	72
	Secondaire inférieur	6,7	(1,4-12,1)	5,3	(2,4-11,4)	88
	Secondaire supérieur	5,7	(2,7-8,7)	2,9	(1,5-5,5)	312
	Enseignement supérieur	5,4	(3,5-7,3)	3,2	(2,0-5,0)	872
ANNEE	2018	5,8	(4,3-7,4)	.	.	1379

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 40. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a déjà consommé une drogue autre que le cannabis au cours de son existence, Région bruxelloise

ID07_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	14,2	(11,1-17,4)	12,4	(9,7-15,7)	602
	Femme	9,1	(6,7-11,5)	7,7	(5,9-10,1)	672
GROUPE D'AGE	15 - 24	6,2	(1,6-10,7)	5,9	(2,8-11,9)	118
	25 - 34	16,7	(11,4-21,9)	16,4	(11,8-22,3)	284
	35 - 44	14,8	(9,9-19,6)	14,5	(10,3-20,0)	341
	45 - 54	7,7	(4,4-11,1)	7,6	(4,9-11,5)	274
	55 - 64	8,0	(4,7-11,4)	8,0	(5,3-11,9)	257
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	3,4	(0,0-7,6)	2,9	(0,8-9,7)	66
	Secondaire inférieur	3,1	(0,0-6,8)	3,2	(1,0-9,7)	78
	Secondaire supérieur	9,1	(5,2-13,0)	7,4	(4,8-11,2)	271
	Enseignement supérieur	14,0	(11,0-17,0)	11,9	(9,4-15,0)	826
ANNEE	2008	6,0	(4,5-7,4)	5,2	(4,0-6,7)	1467
	2013	5,6	(3,7-7,6)	4,9	(3,3-7,2)	1070
	2018	11,7	(9,5-13,8)	10,3	(8,5-12,4)	1274

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 41. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le cannabis au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise

ID07_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	6,4	(4,0-8,8)	3,9	(2,4-6,3)	602
	Femme	3,0	(1,4-4,5)	1,8	(1,0-3,0)	672
GROUPE D'AGE	15 - 24	3,4	(0,0-7,0)	3,0	(1,0-8,8)	118
	25 - 34	10,0	(5,8-14,2)	9,5	(6,0-14,7)	284
	35 - 44	3,8	(1,2-6,4)	3,6	(1,8-6,8)	341
	45 - 54	2,8	(0,4-5,1)	2,6	(1,1-5,9)	274
	55 - 64	0,5	(0,0-1,2)	0,5	(0,1-1,9)	257
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	0,6	(0,0-1,8)	0,3	(0,0-2,9)	66
	Secondaire inférieur	1,2	(0,0-3,7)	0,9	(0,1-6,4)	78
	Secondaire supérieur	3,9	(1,0-6,8)	2,0	(0,9-4,5)	271
	Enseignement supérieur	5,5	(3,5-7,6)	3,3	(2,1-5,2)	826
ANNEE	2008	2,2	(1,3-3,1)	1,3	(0,8-2,1)	1470
	2013	2,5	(1,0-4,0)	1,5	(0,8-2,9)	1072
	2018	4,7	(3,2-6,1)	2,9	(2,0-4,2)	1274

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 42. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le cannabis au cours des 30 derniers jours, Région bruxelloise

ID07_3		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	2,9	(1,3-4,5)	2,1	(1,1-3,9)	602
	Femme	1,3	(0,2-2,4)	1,0	(0,5-2,0)	672
GROUPE D'AGE	15 - 24	2,2	(0,0-5,4)	2,0	(0,4-8,1)	118
	25 - 34	4,2	(1,0-7,5)	3,9	(1,7-8,9)	284
	35 - 44	1,3	(0,0-2,5)	1,2	(0,4-3,1)	341
	45 - 54	1,5	(0,0-3,1)	1,4	(0,5-3,9)	274
	55 - 64	0,5	(0,0-1,2)	0,5	(0,1-1,8)	257
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	0,6	(0,0-1,8)	0,4	(0,0-3,1)	66
	Secondaire inférieur	1,2	(0,0-3,7)	1,0	(0,1-7,0)	78
	Secondaire supérieur	1,4	(0,0-3,1)	0,8	(0,2-2,7)	271
	Enseignement supérieur	2,5	(1,0-4,1)	1,8	(0,9-3,3)	826
ANNEE	2018	2,1	(1,0-3,2)	.	.	1274

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 43. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé de la cocaïne au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise

ID7_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	3,8	(1,9-5,6)	2,1	(1,1-3,9)	602
	Femme	2,2	(0,9-3,4)	1,2	(0,6-2,4)	672
GROUPE D'AGE	15 - 24	1,4	(0,0-3,3)	1,3	(0,3-5,3)	118
	25 - 34	6,2	(2,9-9,5)	6,0	(3,4-10,3)	284
	35 - 44	3,0	(0,5-5,4)	2,9	(1,3-6,2)	341
	45 - 54	1,9	(0,0-3,9)	1,9	(0,7-5,0)	274
	55 - 64	0,2	(0,0-0,6)	0,2	(0,0-1,4)	257
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	0,6	(0,0-1,8)	0,3	(0,0-3,6)	66
	Secondaire inférieur	1,2	(0,0-3,7)	0,8	(0,1-6,1)	78
	Secondaire supérieur	1,6	(0,0-3,2)	0,8	(0,2-2,5)	271
	Enseignement supérieur	3,8	(2,1-5,5)	2,1	(1,2-3,6)	826
ANNEE	2008	1,6	(0,9-2,4)	1,0	(0,6-1,6)	1470
	2013	1,8	(0,4-3,1)	1,1	(0,5-2,4)	1072
	2018	3,0	(1,8-4,1)	1,8	(1,1-2,8)	1274

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 44. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé de l'ecstasy au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise

ID7_3		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	3,0	(1,5-4,6)	0,1	(0,1-0,2)	602
	Femme	2,0	(0,7-3,4)	0,1	(0,0-0,1)	672
GROUPE D'AGE	15 - 24	2,7	(0,0-6,1)	2,6	(0,7-8,7)	118
	25 - 34	5,8	(2,4-9,2)	5,7	(3,1-10,3)	284
	35 - 44	2,2	(0,6-3,9)	2,2	(1,1-4,5)	341
	45 - 54	0,4	(0,0-1,2)	0,4	(0,1-2,7)	274
	55 - 64	0,0	.	0,0	.	257
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	0,0	.	0,0	.	66
	Secondaire inférieur	1,2	(0,0-3,7)	0,0	.	78
	Secondaire supérieur	1,6	(0,0-3,4)	0,0	.	271
	Enseignement supérieur	3,0	(1,4-4,6)	0,1	(0,1-0,2)	826
ANNEE	2008	0,8	(0,2-1,4)	0,0	.	1470
	2013	1,6	(0,3-3,0)	0,1	(0,0-0,2)	1072
	2018	2,5	(1,4-3,6)	0,1	(0,1-0,2)	1274

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 45. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé différents types de drogues au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise

ID_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	6,6	(4,0-9,2)	3,4	(1,9-6,1)	524
	Femme	3,1	(1,5-4,8)	1,6	(0,9-2,9)	640
GROUPE D'AGE	15 - 24	4,2	(0,0-8,6)	3,9	(1,3-11,2)	97
	25 - 34	10,5	(6,0-15,1)	10,1	(6,4-15,8)	253
	35 - 44	4,3	(1,3-7,3)	4,1	(2,1-8,0)	306
	45 - 54	2,1	(0,0-4,2)	2,0	(0,7-5,3)	259
	55 - 64	0,2	(0,0-0,6)	0,2	(0,0-1,5)	249
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	0,7	(0,0-2,1)	0,3	(0,0-3,3)	62
	Secondaire inférieur	1,4	(0,0-4,1)	1,0	(0,1-7,3)	71
	Secondaire supérieur	3,4	(0,7-6,2)	1,5	(0,6-3,9)	252
	Enseignement supérieur	5,9	(3,6-8,1)	3,0	(1,8-5,1)	750
ANNEE	2008	1,7	(0,9-2,6)	0,9	(0,5-1,7)	1483
	2013	2,2	(0,7-3,7)	1,3	(0,6-2,5)	1099
	2018	4,8	(3,2-6,3)	2,8	(1,9-4,2)	1164

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 46. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a déjà consommé du cannabis au cours de son existence, Région wallonne

ID01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	27,7	(23,2-32,1)	26,6	(22,3-31,4)	1015
	Femme	16,5	(13,4-19,6)	15,4	(12,5-18,9)	1098
GROUPE D'AGE	15 - 24	30,3	(22,2-38,4)	29,6	(22,1-38,4)	301
	25 - 34	35,3	(28,1-42,6)	35,3	(28,5-42,8)	331
	35 - 44	24,3	(18,5-30,2)	23,9	(18,6-30,2)	427
	45 - 54	15,7	(11,2-20,3)	15,3	(11,3-20,3)	539
	55 - 64	8,8	(4,8-12,8)	8,6	(5,4-13,4)	515
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	19,9	(7,7-32,2)	19,0	(9,1-35,2)	75
	Secondaire inférieur	15,5	(8,4-22,5)	14,0	(8,6-22,1)	262
	Secondaire supérieur	18,6	(13,8-23,4)	16,4	(12,4-21,5)	676
	Enseignement supérieur	26,1	(22,0-30,1)	25,1	(21,0-29,6)	1052
ANNEE	2001	8,6	(7,2-9,9)	6,0	(5,0-7,2)	2986
	2004	12,1	(10,2-14,0)	9,0	(7,5-10,7)	2627
	2008	13,3	(11,3-15,4)	10,5	(8,8-12,5)	1935
	2013	14,8	(12,5-17,0)	11,7	(9,9-13,8)	1979
	2018	22,0	(19,2-24,7)	19,1	(16,3-22,2)	2113

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 47. Age moyen à la première consommation de cannabis dans la population de 15 à 64 ans, Région wallonne

ID02_1		Moyenne brut	CI 95% brut	Moyenne stand*	CI 95% stand	N
SEXE	Homme	19,1	(18,0-20,2)	20,5	(19,1-22,0)	244
	Femme	19,7	(18,0-21,5)	21,7	(19,6-23,8)	193
GROUPE D'AGE	15 - 24	16,5	(16,0-17,1)	16,6	(16,0-17,2)	78
	25 - 34	17,4	(16,8-18,0)	17,6	(16,9-18,2)	125
	35 - 44	18,5	(17,7-19,3)	18,6	(17,8-19,4)	113
	45 - 54	22,2	(19,6-24,7)	22,4	(19,9-24,9)	87
	55 - 64	29,6	(21,8-37,4)	29,8	(22,4-37,2)	34
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	17,8	(15,4-20,3)	20,7	(17,4-24,0)	14
	Secondaire inférieur	19,1	(15,5-22,7)	21,6	(18,2-25,0)	30
	Secondaire supérieur	18,6	(16,4-20,8)	20,7	(18,3-23,2)	126
	Enseignement supérieur	19,8	(18,4-21,1)	21,2	(19,6-22,9)	260
ANNEE	2004	18,3	(17,6-19,0)	22,2	(20,8-23,6)	292
	2008	18,6	(17,3-19,9)	22,0	(20,4-23,6)	252
	2013	18,7	(17,6-19,7)	22,1	(20,6-23,6)	288
	2018	19,3	(18,3-20,4)	21,4	(20,0-22,7)	437

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 48. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, Région wallonne

ID03_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	10,6	(7,2-14,1)	6,2	(3,9-9,6)	1014
	Femme	3,1	(1,8-4,4)	1,7	(1,0-2,8)	1097
GROUPE D'AGE	15 - 24	17,2	(10,1-24,3)	14,9	(9,4-22,8)	301
	25 - 34	12,1	(6,7-17,5)	10,7	(6,8-16,3)	331
	35 - 44	6,7	(2,5-10,8)	5,6	(3,0-10,2)	426
	45 - 54	1,1	(0,0-2,3)	0,9	(0,3-2,7)	538
	55 - 64	0,6	(0,0-1,4)	0,5	(0,1-2,1)	515
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	9,7	(0,4-18,9)	4,1	(1,1-13,7)	75
	Secondaire inférieur	7,3	(2,0-12,6)	3,9	(1,8-8,3)	261
	Secondaire supérieur	7,9	(4,3-11,5)	3,5	(1,9-6,3)	676
	Enseignement supérieur	5,9	(3,5-8,3)	2,9	(1,7-4,9)	1051
ANNEE	2004	4,6	(3,4-5,9)	2,2	(1,5-3,2)	2621
	2008	4,9	(3,5-6,3)	2,5	(1,6-3,8)	1931
	2013	5,8	(4,4-7,2)	2,9	(2,1-4,1)	1976
	2018	6,8	(4,9-8,6)	3,6	(2,6-5,0)	2111

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 49. Pourcentage des consommateurs de cannabis de 15 à 64 ans qui n'en ont pas consommé au cours des 12 derniers mois, Région wallonne

ID03_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	61,5	(51,9-71,1)	72,4	(61,0-81,4)	247
	Femme	81,0	(73,5-88,5)	91,0	(84,2-95,0)	193
GROUPE D'AGE	15 - 24	43,3	(26,8-59,7)	44,5	(28,9-61,3)	79
	25 - 34	65,8	(52,9-78,6)	70,9	(58,0-81,1)	126
	35 - 44	72,5	(58,4-86,7)	77,1	(62,8-87,0)	113
	45 - 54	92,8	(85,1-100,0)	95,1	(85,6-98,5)	87
	55 - 64	93,4	(83,0-100,0)	95,3	(81,1-99,0)	35
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	51,6	(6,9-96,2)	78,6	(36,5-95,9)	14
	Secondaire inférieur	52,5	(25,1-80,0)	75,3	(49,1-90,6)	31
	Secondaire supérieur	57,6	(42,7-72,5)	73,6	(58,4-84,7)	127
	Enseignement supérieur	77,2	(69,1-85,4)	88,7	(81,2-93,5)	261
ANNEE	2004	61,0	(52,6-69,3)	76,4	(66,9-83,8)	299
	2008	62,0	(53,7-70,4)	74,7	(62,9-83,7)	255
	2013	60,4	(52,7-68,0)	73,5	(64,1-81,1)	291
	2018	69,0	(62,0-75,9)	77,5	(70,9-83,0)	440

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 50. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours, Région wallonne

ID05_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	7,0	(4,2-9,7)	0,3	(0,2-0,5)	1014
	Femme	2,0	(0,9-3,2)	0,1	(0,0-0,1)	1097
GROUPE D'AGE	15 - 24	11,6	(5,8-17,5)	10,0	(5,7-16,9)	301
	25 - 34	6,8	(2,8-10,9)	6,0	(3,3-10,4)	331
	35 - 44	5,2	(1,3-9,1)	4,5	(2,2-9,1)	426
	45 - 54	0,9	(0,0-2,1)	0,8	(0,2-2,7)	538
	55 - 64	0,0	.	0,0	.	515
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	9,3	(0,1-18,6)	0,3	(0,1-1,2)	75
	Secondaire inférieur	4,7	(0,7-8,7)	0,2	(0,1-0,4)	261
	Secondaire supérieur	6,0	(2,7-9,2)	0,2	(0,1-0,4)	676
	Enseignement supérieur	3,2	(1,5-4,9)	0,1	(0,1-0,2)	1051
ANNEE	2001	2,8	(1,8-3,7)	1,2	(0,7-2,0)	2986
	2004	3,0	(1,9-4,0)	1,4	(0,8-2,2)	2621
	2008	2,7	(1,6-3,8)	1,3	(0,7-2,4)	1931
	2013	3,6	(2,5-4,7)	1,7	(1,1-2,7)	1974
	2018	4,5	(3,0-5,9)	2,2	(1,4-3,5)	2111

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 51. Distribution (%) de la population 15 à 64 ans ayant consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours selon leur fréquence de consommation, Région wallonne

ID06_1		20 jours ou plus	10 à 19 jours	1 à 9 jours	N
SEXE	Homme	34,7	13,5	51,7	48
	Femme	30,5	12,7	56,9	26
GROUPE D'AGE	15 - 24	17,9	9,6	72,4	29
	25 - 34	55,5	12,6	31,9	25
	35 - 44	35,1	11,9	52,9	15
	45 - 54	40,1	57,9	2,0	5
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	42,4	18,4	39,2	5
	Secondaire inférieur	64,3	34,9	0,8	11
	Secondaire supérieur	38,9	10,9	50,2	31
	Enseignement supérieur	14,9	7,9	77,2	27
ANNEE	2004	30,2	21,4	48,4	67
	2008	28,5	6,3	65,3	55
	2013	18,1	13,7	68,2	60
	2018	33,7	13,3	52,9	74

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

Tableau B 52. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé intensivement (20+ jours) du cannabis au cours des 30 derniers jours, Région wallonne

ID06_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	2,4	(1,0-3,9)	0,1	(0,1-0,2)	1014
	Femme	0,6	(0,1-1,1)	0,0	.	1097
GROUPE D'AGE	15 - 24	2,1	(0,4-3,8)	1,7	(0,7-4,0)	301
	25 - 34	3,8	(0,7-6,8)	3,2	(1,5-6,6)	331
	35 - 44	1,8	(0,0-3,8)	1,5	(0,5-4,3)	426
	45 - 54	0,4	(0,0-0,9)	0,3	(0,1-1,2)	538
	55 - 64	0,0	.	0,0	.	515
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	4,0	(0,0-11,8)	0,1	(0,0-1,1)	75
	Secondaire inférieur	3,0	(0,0-6,4)	0,1	(0,0-0,3)	261
	Secondaire supérieur	2,3	(0,8-3,8)	0,1	(0,0-0,2)	676
	Enseignement supérieur	0,5	(0,0-1,1)	0,0	.	1051
ANNEE	2004	0,9	(0,4-1,4)	0,0	.	2620
	2008	0,8	(0,3-1,2)	0,0	.	1931
	2013	0,7	(0,2-1,1)	0,0	.	1974
	2018	1,5	(0,8-2,3)	0,1	(0,0-0,1)	2111

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 53. Distribution (%) de la population de 15 à 64 ans selon le risque d'usage problématique du cannabis au cours des 12 derniers mois, Région wallonne

ID04_1		Pas/peu de risque	Risque modéré	Risque élevé	N
SEXE	Homme	94,8	1,7	3,5	1013
	Femme	99,2	0,2	0,5	1097
GROUPE D'AGE	15 - 24	94,5	2,4	3,1	301
	25 - 34	93,8	1,2	5,0	331
	35 - 44	97,0	0,8	2,2	426
	45 - 54	99,1	0,6	0,3	537
	55 - 64	99,8	0,2	0,0	515
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	90,9	1,2	7,9	75
	Secondaire inférieur	94,1	1,8	4,2	261
	Secondaire supérieur	96,2	1,1	2,7	675
	Enseignement supérieur	98,7	0,7	0,5	1051
ANNEE	2018	97,1	1,0	1,9	2110

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

Tableau B 54. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant présenté une consommation problématique de cannabis au cours des 12 derniers mois, Région wallonne

ID04_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	5,2	(3,1-7,2)	3,0	(1,7-5,2)	1013
	Femme	0,8	(0,2-1,3)	0,4	(0,2-1,0)	1097
GROUPE D'AGE	15 - 24	5,5	(2,4-8,6)	3,7	(1,9-6,9)	301
	25 - 34	6,2	(2,2-10,2)	4,5	(2,4-8,2)	331
	35 - 44	3,0	(0,7-5,3)	2,1	(0,9-4,6)	426
	45 - 54	0,9	(0,0-2,1)	0,6	(0,2-2,2)	537
	55 - 64	0,2	(0,0-0,5)	0,1	(0,0-0,8)	515
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	9,1	(0,0-18,4)	3,6	(0,9-12,7)	75
	Secondaire inférieur	5,9	(1,6-10,3)	2,7	(1,2-5,9)	261
	Secondaire supérieur	3,8	(1,7-5,9)	1,4	(0,6-3,2)	675
	Enseignement supérieur	1,3	(0,3-2,2)	0,5	(0,2-1,2)	1051
ANNEE	2018	2,9	(1,9-3,9)	.	.	2110

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 55. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a déjà consommé une drogue autre que le cannabis au cours de son existence, Région wallonne

ID07_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	9,8	(6,5-13,1)	8,5	(6,1-11,8)	903
	Femme	4,0	(2,3-5,7)	3,4	(2,1-5,5)	959
GROUPE D'AGE	15 - 24	3,6	(0,8-6,4)	3,2	(1,5-6,9)	282
	25 - 34	11,4	(5,7-17,2)	10,6	(6,5-16,9)	306
	35 - 44	11,1	(6,0-16,1)	10,3	(6,5-15,9)	380
	45 - 54	5,3	(1,8-8,8)	4,9	(2,5-9,4)	458
	55 - 64	2,7	(0,6-4,9)	2,5	(1,1-5,6)	436
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	7,2	(0,0-17,4)	6,0	(1,5-21,5)	61
	Secondaire inférieur	5,6	(1,1-10,2)	4,2	(1,8-9,5)	220
	Secondaire supérieur	9,7	(5,4-13,9)	7,5	(4,9-11,3)	573
	Enseignement supérieur	5,3	(3,4-7,2)	4,2	(2,6-6,6)	969
ANNEE	2008	3,6	(2,5-4,6)	2,6	(1,9-3,7)	1898
	2013	2,6	(1,8-3,5)	1,9	(1,4-2,7)	1952
	2018	6,8	(5,0-8,7)	5,3	(4,0-7,1)	1862

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 56. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le cannabis au cours des 12 derniers mois, Région wallonne

ID07_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	2,8	(1,0-4,5)	0,1	(0,1-0,2)	903
	Femme	1,1	(0,2-2,1)	0,0	.	959
GROUPE D'AGE	15 - 24	2,5	(0,0-5,0)	2,2	(0,8-6,1)	282
	25 - 34	3,1	(0,0-6,3)	2,9	(1,1-7,3)	306
	35 - 44	3,7	(0,8-6,5)	3,4	(1,4-7,8)	380
	45 - 54	0,7	(0,0-1,9)	0,6	(0,1-3,9)	458
	55 - 64	0,0	.	0,0	.	436
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	6,3	(0,0-16,4)	0,3	(0,1-1,4)	61
	Secondaire inférieur	3,3	(0,0-7,4)	0,1	(0,0-0,4)	220
	Secondaire supérieur	1,8	(0,2-3,5)	0,1	(0,0-0,2)	573
	Enseignement supérieur	1,5	(0,3-2,7)	0,1	(0,0-0,1)	969
ANNEE	2008	1,3	(0,7-2,0)	0,8	(0,4-1,6)	1909
	2013	0,4	(0,1-0,8)	0,3	(0,1-0,6)	1952
	2018	1,9	(1,0-2,9)	1,2	(0,6-2,2)	1862

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 57. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le cannabis au cours des 30 derniers jours, Région wallonne

ID07_3		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	0,9	(0,1-1,6)	0,0	.	903
	Femme	0,1	(0,0-0,2)	0,0	.	959
GROUPE D'AGE	15 - 24	0,8	(0,0-2,0)	0,5	(0,1-2,1)	282
	25 - 34	0,3	(0,0-0,8)	0,2	(0,0-1,1)	306
	35 - 44	0,6	(0,0-1,2)	0,3	(0,1-1,8)	380
	45 - 54	0,7	(0,0-1,9)	0,4	(0,1-2,4)	458
	55 - 64	0,0	.	0,0	.	436
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	1,5	(0,0-4,6)	0,1	(0,0-0,5)	61
	Secondaire inférieur	0,7	(0,0-2,2)	0,0	.	220
	Secondaire supérieur	0,9	(0,0-1,9)	0,0	.	573
	Enseignement supérieur	0,1	(0,0-0,2)	0,0	.	969
ANNEE	2018	0,5	(0,1-0,8)	.	.	1862

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 58. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé de la cocaïne au cours des 12 derniers mois, Région wallonne

ID7_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	1,5	(0,2-2,7)	0,0	.	903
	Femme	0,1	(0,0-0,2)	0,0	.	959
GROUPE D'AGE	15 - 24	1,8	(0,0-4,0)	0,7	(0,2-2,7)	282
	25 - 34	1,1	(0,0-3,2)	0,4	(0,1-2,9)	306
	35 - 44	1,1	(0,0-2,6)	0,4	(0,1-2,3)	380
	45 - 54	0,0	.	0,0	.	458
	55 - 64	0,0	.	0,0	.	436
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	0,0	.	0,0	.	61
	Secondaire inférieur	0,7	(0,0-2,2)	0,0	.	220
	Secondaire supérieur	0,8	(0,0-2,1)	0,0	.	573
	Enseignement supérieur	0,7	(0,0-1,6)	0,0	.	969
ANNEE	2008	0,9	(0,3-1,6)	0,0	.	1910
	2013	0,2	(0,0-0,5)	0,0	.	1952
	2018	0,7	(0,1-1,4)	0,0	.	1862

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 59. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé de l'ecstasy au cours des 12 derniers mois, Région wallonne

ID7_3		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	1,2	(0,0-2,3)	0,0	.	903
	Femme	0,1	(0,0-0,2)	0,0	.	959
GROUPE D'AGE	15 - 24	1,8	(0,0-4,0)	0,8	(0,2-2,9)	282
	25 - 34	1,5	(0,0-3,8)	0,7	(0,1-3,2)	306
	35 - 44	0,0	.	0,0	.	380
	45 - 54	0,0	.	0,0	.	458
	55 - 64	0,0	.	0,0	.	436
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	0,0	.	0,0	.	61
	Secondaire inférieur	2,9	(0,0-6,8)	0,0	.	220
	Secondaire supérieur	0,2	(0,0-0,6)	0,0	.	573
	Enseignement supérieur	0,4	(0,0-1,0)	0,0	.	969
ANNEE	2008	0,6	(0,2-1,0)	0,0	.	1909
	2013	0,2	(0,0-0,5)	0,0	.	1952
	2018	0,6	(0,0-1,2)	0,0	.	1862

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 60. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé différents types de drogues au cours des 12 derniers mois, Région wallonne

ID_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	2,9	(0,9-4,8)	0,1	(0,1-0,3)	840
	Femme	0,4	(0,0-0,9)	0,0	(0,0-0,1)	912
GROUPE D'AGE	15 - 24	2,9	(0,0-5,9)	2,0	(0,6-6,6)	242
	25 - 34	3,2	(0,0-6,6)	2,3	(0,8-6,5)	270
	35 - 44	1,8	(0,0-4,1)	1,2	(0,4-4,0)	358
	45 - 54	0,6	(0,0-1,9)	0,4	(0,1-3,0)	449
	55 - 64	0,0	.	0,0	.	433
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	6,6	(0,0-17,0)	0,2	(0,0-1,3)	58
	Secondaire inférieur	3,5	(0,0-7,8)	0,1	(0,0-0,4)	208
	Secondaire supérieur	1,4	(0,0-3,0)	0,0	.	533
	Enseignement supérieur	1,0	(0,0-2,0)	0,0	.	914
ANNEE	2008	0,9	(0,3-1,5)	0,5	(0,2-1,2)	1945
	2013	0,3	(0,0-0,5)	0,1	(0,0-0,4)	1994
	2018	1,6	(0,6-2,5)	0,9	(0,4-1,8)	1752

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

CONTACT

Lydia Gisle • T+32 2 642 57 53 • Lydia.Gisle@sciensano.be

POUR PLUS D'INFORMATIONS

—

Rendez-vous sur notre site
web >www.sciensano.be ou
contactez-nous à l'adresse
>info@sciensano.be

Sciensano • Rue Juliette Wytsman 14 • Bruxelles • Belgique • T + 32 2 642 51 11 • T presse + 32 2 642 54 20 •
info@sciensano.be • www.sciensano.be

Éditeur responsable : Myriam Sneyers, Directeur général • Rue Juliette Wytsman 14 • Bruxelles • Belgique • D/2019/14.440/68